

GAM Online Reporting Tool

Paraguay - 2023

I Portada

1) ¿Qué instituciones/entidades fueron responsables de completar los formularios de indicadores?

a) Comité Nacional de Sida o equivalente: No

b) Programa Nacional de Sida: Sí

c) Otros: Sí

Si son otros, especifique: Organizaciones civiles (Parte B ICNP)

2) Con la colaboración de

Ministerio de Educación: No

Ministerio de Salud: Sí

Ministerio de Trabajo: No

Ministerio de Asuntos Exteriores: No

Otro Ministerio: No

Si es otro Ministerio, especifique:

Organizaciones de la sociedad civil: Sí

Personas que viven con el VIH: No

Sector privado: No

Organizaciones de Naciones Unidas: Sí

Organizaciones bilaterales: No

ONG internacionales: No

Otros: No

Si son otros, especifique:

3) ¿Se dialogó sobre el informe en un gran foro?: No

4) ¿Están los resultados de la encuesta almacenados centralmente?: Sí

5) ¿Están disponibles los datos para su consulta pública?: Sí

6) ¿Quién es la persona responsable del envío del informe?

Nombre(s) / puesto(s):: Dra. Elena Candia/ Directora del PRONASIDA MSP BS - Dra. Giulia Cipolla/ Jefa del Dpto. de Vigilancia Epidemiológica PRONASIDA MSP BS.

Dirección(es):: Avenida Venezuela casi Florida

Correo(s) electrónico(s):: estrategica.pronasida@mospbs.gov.py

Teléfono(s):: 0981977311

II Reporte narrativo

Visión general: En adjunto enviamos el archivo spectrum donde se puede apreciar los números reales sobre el total de nuevos diagnósticos 2023, el total de pacientes en tratamiento y seguimiento.

Declaración política y marco de monitoreo 1. Prevención combinada del VIH para todos: Paraguay a través del PRONASIDA, programa dependiente del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, quien lleva la rectoría en políticas públicas sobre atención y servicios para pacientes afectados por el virus del VIH y sus alianzas con los demás estamentos del estado, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. Desde el programa estamos convencidos que la prevención es el mejor camino a disminuir la tasa de transmisión.

Declaración política y marco de monitoreo 2. Cumplimiento del objetivo 95-95-95 para pruebas de detección del VIH y el tratamiento del VIH: Paraguay esta enfocado en el cumplimiento de las metas y abocado a disminuir las brechas.

Declaración política y marco de monitoreo 3. Poner fin al sida infantil y eliminar la transmisión vertical: en todo el territorio nacional todos los habitantes tanto niños y adultos tienen derecho a la salud (diagnostico y tratamiento) gratuitos, garantizados por la constitución.

Declaración política y marco de monitoreo 4. Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas: en todo el territorio nacional todos los habitantes tanto niños y adultos tienen derecho a la salud (diagnostico y tratamiento) gratuitos, garantizados por la constitución.

Declaración política y marco de monitoreo 5. Liderazgo comunitario: Desde el PRONASIDA, a través de la respuesta nacional del vih, se realiza trabajos coordinados con las organizaciones de la sociedad civil y los demás organismos del estado garantizando a toda persona que viva en el territorio nacional que acceda a diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta patología así como también la lucha constante para evitar discriminación por género, raza o religión.

Declaración política y marco de monitoreo 6. Realización de los derechos humanos y eliminación del estigma y la discriminación: A través de la ley 3940/09 se garantiza que toda persona afectada por el virus tratada en igualdad de género, raza y religión.

Declaración política y marco de monitoreo 7. Cobertura sanitaria universal e integración: Desde el año 2008 en el país se declara la gratuidad de la salud pública para toda persona que vive en el territorio nacional.

Declaración política y marco de monitoreo 8. Inversiones y recursos: En la descripción del reporte hemos adjuntado el gasto relativo de VIH.

1.1 Incidencia del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Medición indirecta (por ejemplo, Spectrum o AEM)

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

por sexo y edad

	15-49	50+	15-24	0-14	Todos
Incidencia : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas					
Numerador : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000					
Denominador : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)					

por sexo y edad

	Hombres (15-49)	Mujeres (15-49)	Hombres (50+)	Mujeres (50+)	Hombres (15-24)	Mujeres (15-24)
Incidencia : Número de nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas						
Numerador : Número de nuevas infecciones durante el periodo de reporte multiplicado por 1000						
Denominador : Número total de personas no infectadas (o persona-años expuesta)						

1.2A Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Estudio de prevalencia

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Estudio de prevalencia Diseño del estudio: usando el mapeo geográfico de los lugares del comercio de sexo, el estudio descriptivo, corte transversal, prevalencia anónima ligada y de conducta; se recogió

información sobre conocimientos, prácticas de riesgo y actitudes. Se colectaron muestras de sangre para determinar la prevalencia de VIH/sífilis/Hepatitis B en mujeres trabajadoras sexuales, en Asunción, Central, Alto Paraná, Caaguazú y Amambay entre mayo y setiembre del 2023.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos: Diseño del estudio: usando el mapeo geográfico de los lugares del comercio de sexo, el estudio descriptivo, corte transversal, prevalencia anónima ligada y de conducta; se recogió información sobre conocimientos, prácticas de riesgo y actitudes. Se colectaron muestras de sangre para determinar la prevalencia de VIH/sífilis/Hepatitis B en mujeres trabajadoras sexuales, en Asunción, Central, Alto Paraná, Caaguazú y Amambay entre mayo y setiembre del 2023. Encuesta de prevalencia del VIH/Sífilis/Hepatitis B/C. Comportamientos, Prácticas y actitudes de la población MTS (Mujeres trabajadoras sexuales) en el Paraguay, 2023.

Año de la última estimación: 2023

Estimación del tamaño: 9053

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.): Para todo el país

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda: Definición utilizada para la población Ser mujer de nacimiento Recibir dinero a cambio de sexo oral, vaginal y/o anal en las regiones del estudio en los últimos 12 meses. Consigue clientes por cualquiera de las diversas formas conocidas en el país (establecimientos, lugares públicos, por páginas de Internet, por avisos en diarios). Criterios de inclusión: personas de la población MTS (Mujeres Trabajadoras Sexuales) igual o mayores a 18 años de edad.

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: Método de captura-recaptura

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Profesionales del sexo

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Asunción			

1.2B Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición: Múltiples listados programáticos y de estudio (registros o fuentes) de la población respectiva

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Se utilizó el muestreo dirigido por el participante, en inglés Respondent Driven Sampling, (RDS) para contar con información más precisa acerca de la prevalencia, comportamientos de riesgo y otros datos relevantes para el estudio.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Año de la última estimación: 2023

Estimación del tamaño: 27768

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.): Corresponden a 4 regiones del país: Asunción, Central, Caaguazú y Alto Paraná.

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda: • Persona de sexo masculino de nacimiento • Tuvo sexo anal, oral o masturbación con otro hombre en los últimos 12 meses

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: Se realizaron las estimaciones en cada población y zona por el método de captura-recaptura (CR) con modelos de regresión log-lineales, tomando como insumo múltiples listados (registros o fuentes) de la población respectiva

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Asunción			

1.2C Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas que usan drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño:

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Usuarios de drogas inyectables

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Asunción			

1.2D Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición: Múltiples listados programáticos y de estudio (registros o fuentes) de la población respectiva

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Año de la última estimación: 2023

Estimación del tamaño: 910

Región para la cual se ha realizado la última estimación (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.): Asunción y Central, Alto Paraná, Amambay y Caaguazú

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda: Persona de sexo masculino de nacimiento Auto-identifica como persona transgénero Personas de la población trans femeninos mayores a 14 años de edad

Método utilizado para obtener la estimación del tamaño: Se realizaron las estimaciones en cada población y zona por el método de captura-recaptura (CR) con modelos de regresión log-lineales, tomando como insumo múltiples listados (registros o fuentes) de la población respectiva

Comentarios y información adicional:

Datos sub-nacionales - Personas transgénero

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño	Método para derivar la estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Asunción			

1.2E Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave: Personas en prisiones y otros entornos cerrados

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Año de la última estimación:

Estimación del tamaño:

Región para la cual se ha realizado el último censo (por ejemplo, para todo el país, para una provincia, para la capital, etc.):

Definición utilizada para la población y criterios de inclusión utilizados en el estudio/encuesta, según corresponda:

Comentarios y información adicional (incluir la fuente y otra información de referencia pertinente):

Datos sub-nacionales - personas en prisión

Tipo de área	Nombre de área	Año de la última estimación	Estimación del tamaño
Ciudad/Ciudad	Asunción		

1.3A Prevalencia del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: Encuesta de Prevalencia del VIH/Sífilis/Hepatitis B/C Comportamientos, Prácticas y Actitudes de la Población MTS (Mujeres Trabajadoras Sexuales) en el Paraguay, 2023. Asunción - Paraguay

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 902

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven del VIH	0.6		0.6		0.3	100
Numerador : Número de profesionales del sexo que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH	5		5		3	2
Denominador : Número de profesionales del sexo que se someten a pruebas sobre el VIH	902		902		900	2

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

1.3B Prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición: Estudio de Prevalencia de VIH, Sífilis Hepatitis B, Hepatitis C conocimientos, prácticas de riesgo y actitudes de hombres que tienen sexo con hombres en Asunción, Central, Alto Paraná y Caaguazú. 2023.

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Es importante aclarar que debido a la utilización del RDS que implica el análisis por redes sociales no es posible combinar las prevalencias de los diferentes sitios de reclutamiento, por lo cual se reportan por separados Asunción y Central, Caaguazú, Alto Paraná.

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1197

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven del VIH	25.6	25.7	25.6
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH	163	73	90
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se someten a pruebas sobre el VIH	636	284	352

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Región/Provincia									

1.3C Prevalencia del VIH en personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que viven del VIH						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que se someten a pruebas sobre el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

1.3D Prevalencia del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: Estudio de la Prevalencia VIH/Sífilis/Hepatitis B/C y comportamientos, prácticas y actitudes de la población TRANS en el Paraguay. 2023.

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 411

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven del VIH	29.9	29.9	0	0	0	0
Numerador : Número de personas transgénero que reciben resultados positivos en pruebas sobre el VIH	123	123	0	0	24	99
Denominador : Número de personas transgénero que se someten a pruebas sobre el VIH	411	411	0	0		

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Asunción												

1.3E Prevalencia del VIH entre las personas en prisiones y otros entornos cerrados

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas en prisión/reclusos/detenidos que viven con el VIH						
Numerador : Número de personas en prisión/reclusos/detenidos que dan positivo en la prueba del VIH						
Denominador : Número de personas en prisión/reclusos/detenidos que se someten a la prueba del VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Porcentaje (%)	Todo - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción							

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

1.4A Pruebas de VIH y conocimiento del estado serológico entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses, o que saben que viven con el VIH						
A : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de profesionales del sexo que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)
Ciudad/Ciudad	Asunción									

1.4B Pruebas de VIH y conocimiento del estado serológico entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH			
A : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo			
B : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo			
Numerador (A + B) : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que conocen su estado serológico respecto del VIH			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"			

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)
Ciudad/Ciudad	Asunción									

1.4C Pruebas de VIH y conocimiento del estado serológico entre las personas que consume drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que se inyectan drogas que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
A : Número de personas que usan drogas inyectables que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de personas que consumen drogas inyectables que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de personas que consumen drogas inyectables y que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de personas que consumen drogas inyectables que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)
Ciudad/Ciudad	Asunción									

1.4D Pruebas de VIH y conocimiento del estado serológico entre personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que se sometieron a la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH						
A : Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas y cuyo resultado es positivo						
B : Número de personas transgénero que se han sometido a pruebas en los últimos 12 meses y cuyo resultado es negativo						
Numerador (A + B) : Número de personas transgénero que conocen su estado serológico respecto del VIH						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la pregunta "¿Conoce usted su estado serológico a través de pruebas para el VIH?"						

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Número de entrevistados en la encuesta	Número de los que contestaron "No, nunca me he sometido a esas pruebas"	Número de los que contestaron "Sí, me he sometido a esas pruebas"	Último test: <12 meses y VIH positivo	Último test: <12 meses y VIH negativo	Última prueba: >12 meses y VIH positivo	Última prueba: >12 meses y VIH negativo	Resultado: Positivo (fecha de la prueba no disponible)	Resultado: Negativo (fecha de la prueba no disponible)
Ciudad/Ciudad	Asunción									

1.5A Uso del preservativo entre los profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: Encuesta de Prevalencia del VIH/Sífilis/Hepatitis B/C Comportamientos, Prácticas y Actitudes de la Población MTS (Mujeres Trabajadoras Sexuales) en el Paraguay, 2023. Asunción - Paraguay.

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 902

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que declara haber utilizado un preservativo con su último cliente	98.7	0	98.7	0		
Numerador : Número de profesionales del sexo que declaró haber usado un preservativo con su último cliente	890	0	890	0		
Denominador : Número de profesionales del sexo que declaró haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero en los últimos 12 meses	902	0	902	0		

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

1.5B Uso del preservativo entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: Prevalencia de VIH Sífilis Hepatitis B y C, conocimientos, prácticas de riesgo y actitudes de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en Asunción, Central y Alto Paraná y Caaguazú. 2023

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: Sí

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 1197

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que declara haber utilizado un preservativo durante su último coito anal con una pareja masculina	83.5		
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declara haber usado un preservativo durante el último coito anal con una pareja masculina	740		
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaró haber mantenido un coito anal con una pareja masculina en los últimos seis meses	886		

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad									

1.5C Uso del preservativo entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que afirma haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirmaron haber utilizado preservativo en su última relación sexual						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas y mantenido relaciones sexuales en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

1.5D Uso del preservativo entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: PREVALENCIA DEL VIH/SIFILIS/HEPATITIS B/C Y COMPORTAMIENTOS, PRÁCTICAS Y ACTITUDES DE LA POBLACION TRANS EN EL PARAGUAY, 2023

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta: 411

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que reportan haber utilizado el preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal	83.2					
Numerador : Número de personas transgénero que notificaron haber utilizado un preservativo durante su última relación sexual o última ocasión en que practicaron sexo anal	321					
Denominador : Número de personas transgénero encuestadas que notificaron haber tenido relaciones sexuales o haber practicado el sexo anal en los últimos seis meses	386					

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Asunción												

1.6A Cobertura de los programas de prevención del VIH entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
Numerador : Número de profesionales del sexo que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

Tabla D. Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.						
Numerador : Porcentaje de profesionales del sexo que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes.						
Denominador : Número de profesionales del sexo que contestaron a la encuesta						

II. Datos de programas

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo.					
Numerador : Número de profesionales del sexo a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
Denominador : Número de profesionales del sexo a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para profesionales del sexo					

1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los profesionales del sexo

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

1.6B Cobertura de los programas de prevención del VIH entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron afirmativamente			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

Tabla D. Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que contestaron a la encuesta			

II. Datos de programas

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres					

1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

1.6C Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

Tabla C. ¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas estériles en los últimos tres meses?

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Ha recibido usted agujas y jeringuillas estériles en los últimos tres meses?"						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

Tabla D. Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que contestaron a la encuesta						

II. Datos de programas

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables con los que se contacta con intervenciones de prevención diseñadas para personas que usan drogas inyectables					
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas que usan drogas inyectables					
Número de agujas y jeringas distribuidas (datos del indicador 3.9)					
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables					

1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas que consumen drogas inyectables

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

1.6D Cobertura de los programas de prevención del VIH entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

I. Vigilancia del comportamiento u otras encuestas especiales

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Tabla A. En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los últimos tres meses, ¿se le han facilitado a usted preservativos y lubricante (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

Tabla B. En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "En los tres últimos meses, ¿ha recibido usted asesoramiento sobre el uso del preservativo y prácticas sexuales seguras (por ejemplo, a través de servicios de extensión, centros de servicios o centros médicos de salud sexual)?"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

Tabla C. ¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que contestaron afirmativamente a la pregunta "¿Se ha sometido usted en los últimos tres meses a pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual?"						
Numerador : Número de personas transgénero que contestaron afirmativamente						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

Tabla D. Porcentaje de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Numerador : Número de personas transgénero que reportan haber recibido como mínimo dos de los servicios de prevención del VIH mencionados anteriormente a través de organizaciones no gubernamentales, proveedores sanitarios u otras fuentes						
Denominador : Número de personas transgénero que contestaron a la encuesta						

II. Datos de programas

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero con los que se contacta con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas transgénero.					
Numerador : Número de personas transgénero a los que se llegó con intervenciones de prevención del VIH diseñadas para personas transgénero					
Número de preservativos y lubricantes distribuidos					
Denominador : Número de personas transgénero					

1.6.1 Número de centros de prestación de servicios dedicados a las personas transgénero

	Valor de datos
Número total de centros de prestación de servicios	
1. Centros operados por el programa nacional (gobierno)	
2. Sitios operados por organizaciones dirigidas por la comunidad, la sociedad civil o una organización no gubernamental	
Número de trabajadores de actividades de divulgación activos en el momento de la notificación.	
Número de áreas administrativas con centros de prestación de servicios	
Número total de áreas administrativas en el país	

1.7 Programas de prevención del VIH en prisiones

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Número de agujas estériles distribuidas entre personas en prisión	
Número de personas en prisión que reciben terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos	
Número de preservativos distribuidos entre personas en prisión	
Número de personas en prisión que reciben terapias antirretrovirales	
Numero de personas en prisión sometidos a pruebas sobre el VIH	

Personas que viven con el VIH de entre las personas en prisión

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH de entre las personas en prisión	
Numerador : Número de personas que viven con el VIH de entre las personas en prisión	

personas en prisión con hepatitis C solamente

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas en prisión que presentan infección por la hepatitis C	
Numerador : Número de personas en prisión que presentan infección por la hepatitis C	

personas en prisión con hepatitis C o que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas en prisión que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	
Numerador : Número de personas en prisión que presentan coinfección por VIH y virus de la hepatitis C	

personas en prisión con TB o que presentan coinfección por VIH y TB

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas en prisión que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	
Numerador : Número de personas en prisión que sufren TB o que presentan coinfección por VIH y TB	

1.8 Prácticas seguras en el consumo de drogas inyectables entre las personas que consumen drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables que afirma haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectó drogas						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haber utilizado equipos de inyección esterilizados la última vez que se inyectaron drogas						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables que afirman haberse inyectado drogas en el último mes						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

1.9 Agujas y jeringuillas distribuidas por cada persona que consume drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Índice : Número de agujas y jeringas distribuidas por cada persona que usa drogas inyectables por año y por programa de agujas y jeringas (redondeado a un número entero)					
Numerador : Número de agujas y jeringas distribuidas en los últimos 12 meses por los programas de agujas y jeringas					
Denominador : Número de usuarios de drogas inyectables en el país					

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Años en los que se recopilan datos	Número de agujas distribuidas por persona y año	Numerador	Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción				

1.10 Cobertura del tratamiento de mantenimiento con agonistas opiáceos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Los datos están ponderados?:

Total and disaggregation by gender and age

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que se inyectan drogas y reciben terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos						
Numerador : Número de personas que se inyectan drogas y reciben terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos en una fecha determinada						
Denominador : Número de personas que se inyectan drogas en el país						

Desglose por tipo de proveedor

	Total	Sector público	Organización dirigida por poblaciones clave	Organizaciones no gubernamentales	Otras entidades
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que se inyectan drogas y reciben terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos					
Numerador : Número de personas que se inyectan drogas y reciben terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos en una fecha determinada					
Denominador : Número de personas que se inyectan drogas en el país					

Nombre de las organizaciones:

Indique el nombre y la URL/sitio web (si está disponible):

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

1.11 Personas que recibieron PrEP

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos)

Otra herramienta/fuente de medición:: Fuente de datos: Sistema de Información del VIH (Consejería y Atención Integral)

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Número de personas que recibieron algún producto de la PrEP al menos una vez durante el periodo que se reporta

	Total	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido	Número de personas que recibieron la PrEP por primera vez en sus vidas durante el período que abarca el informe
Todo	852	728	43	81	0	852
<15	0	0	0	0	0	0
15-19	50	41	4	5	0	50
20-24	218	197	7	14	0	218
25-49	564	473	30	61	0	564
50+	20	17	2	1	0	20
Si no se dispone de desgloses por grupos de edad específicos, sírvase indicar el número total de personas que recibieron PrEP de 15 años o más.						
Edad desconocida						
Número de personas que recibieron algún producto de la PrEP por primera vez en su vida durante el periodo que se reporta	852	728	43	81	0	

Desglose por producto de la PrEP

	Total
Anillo vaginal de dapivirina	0
Cabotegravir inyectable de acción prolongada	0

Disaggregated by key population

	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Personas transgénero	Personas que se inyectan drogas	Personas en prisiones y otros entornos cerrados
Número de personas que recibieron la PrEP al menos una vez durante el período que abarca el informe	705	9	81	0	0

Datos sub-nacionales

Tipo de área	Nombre de área	Todo	Hombres	Mujeres	Transgénero	Sexo desconocido
Ciudad/Ciudad	Asunción					

1.14 Uso del preservativo en la última relación sexual de alto riesgo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos (15-49)	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : El porcentaje de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal, con la que no conviven, entre las personas que hayan mantenido relaciones sexuales con este tipo de pareja en los anteriores 12 meses									
Numerador : El número de encuestados que reportan haber utilizado un preservativo en la última ocasión en que mantuvieron relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven									
Denominador : Número total de encuestados que reportan haber mantenido relaciones sexuales con una pareja no conyugal con la que no conviven, en los anteriores doce meses									

1.15 Número de preservativos distribuidos anualmente

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Datos de almacenes centrales y regionales

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Público	Privado	Organizaciones no gubernamentales
Preservativos masculinos : Número de preservativos masculinos distribuidos en los últimos 12 meses	923976	428613		495363
Preservativos femeninos : Número de preservativos femeninos distribuidos en los últimos 12 meses	3100			3100

1.16 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas correctas a las cinco preguntas

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Numerador : Número de entrevistados de 15 a 24 años que respondió correctamente a las cinco preguntas							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 1: "¿Se puede reducir el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja no infectada que no tiene otras parejas?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 1							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 1							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 2: "¿Puede reducirse el riesgo de contraer el VIH usando preservativos cada vez que se mantienen relaciones sexuales?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 2							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 2							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 3: "¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH?"

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 3							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 3							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 4: "¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 4							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 4							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

Respuestas correctas a la pregunta 5: "Se puede contraer el VIH por compartir alimentos con una persona infectada?" (u otra pregunta específica del país)

	15-24	Todos los hombres (15-24)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Todas las mujeres (15-24)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados que respondió correctamente a la pregunta 5							
Numerador : Número de entrevistados/población que respondió correctamente a la pregunta 5							
Denominador : Número total de entrevistados de 15 a 24 años							

95-95-95 Pruebas y tratamiento del VIH (indicadores 2.1,2.2 y 2.3)

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Instrucciones: Se recomienda encarecidamente a todos los países con poblaciones >250 000 habitantes que seleccionen tomar los datos del archivo Spectrum final para reportar sobre estos indicadores. Para los países que utilicen su Spectrum final, no es necesario cumplimentar las Partes 1, 2 y 3. Si se dispone de datos subnacionales/específicos de la ciudad, debe completarse la Parte 4.

Utilizar datos del archivo final de Spectrum: Sí

Parte 1. Metadatos de indicadores (favor completar solamente en caso de no estar utilizando los datos del archivo de Spectrum final).

2.1 Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha de inicio del período de notificación:

Fecha final del período de referencia:

2.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha de inicio del período de notificación:

Fecha final del período de referencia:

2.3 Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha de inicio del período de notificación:

Fecha final del período de referencia:

2.1,2.2 y 2.3 (denominador: estimaciones de las personas que viven con el VIH)

¿Se dispone de datos para el período de referencia?:

Fecha final del período de referencia:

Parte 2. Total y desagregado por edad/sexo

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Denominador : Estimación de las personas que viven con el VIH				
Límite inferior				
Límite superior				

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignado hombre al nacimiento	Otro sexo (adultos 15+), originalmente reportado como asignada mujer al nacimiento
Indicador 2.1 Numerador : Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH						
Indicador 2.2 Numerador : Personas en tratamiento antirretroviral						
Personas que inician tratamiento antirretroviral						
Personas que reinician el TAR (entre los que iniciaron el TAR)						
Indicador 2.3 Numerador : Personas con VIH en tratamiento antirretroviral que tienen supresión de la carga viral						
Indicador 2.3 Subnumerador : Personas con supresión viral entre los estudiados de forma rutinaria en cuanto a carga viral						
Indicador 2.3 Subdenominador : Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral						

Cálculo de las pruebas de detección y tratamiento del VIH en cascada y porcentajes de 95-95-95

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto al VIH (primeros 95 años)				
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH y están en tratamiento (objetivo: 90%)				
Porcentaje (%) : Personas que viven con el VIH y tienen una carga viral suprimida (objetivo: 86%)*.				
Porcentaje (%) : Personas que están en tratamiento entre las que conocen su estado serológico con respecto al VIH (Segundo 95)				
Porcentaje (%) : Personas en tratamiento antirretroviral que tienen una carga viral suprimida (tercer año 95)*.				
Cobertura de carga viral (%) : Personas en tratamiento antirretroviral que han tenido una prueba de carga viral				

Parte 3. Desagregación por grupos de edad/sexo detallados

Nota: Complete cada fila cuando se disponga de datos desagregados por edad y sexo. Si no se recogen datos detallados sobre la edad y el sexo para un indicador específico de grupos de edad específicos, deje estas celdas en blanco. Consulte la guía del GAM y las FAQ para más detalles.

	< 1	1-4	5-9	10-14	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
Denominador : Estimación de las personas que viven con el VIH												
Indicador 2.2 Numerador : Personas en tratamiento antirretroviral												
Indicador 2.3 Numerador : Personas con VIH en tratamiento antirretroviral que tienen supresión de la carga viral												
Indicador 2.3 Subnumerador : Personas con supresión viral entre los estudiados de forma rutinaria en cuanto a carga viral												
Indicador 2.3 Subdenominador : Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral												

Parte 4. Ciudad específica, todas las edades[Añadir tantas filas como sea necesario]

Tomar los datos del archivo final de Naomi: No

Método para obtener estimaciones subnacionales de las personas que viven con el VIH:

Método para obtener datos subnacionales sobre personas que conocen su estado serológico respecto al VIH:

Tipo de área	Nombre de área	Denominador - Estimativa de las personas que viven con el VIH	Indicador 2.1 Numerador - Personas que viven con el VIH y conocen su estado serológico respecto al VIH	Indicador 2.2 Numerador - Personas en tratamiento antirretroviral	Indicador 2.3 subnumerador - Personas que son suprimidas víricamente entre las personas sometidas a prueba.	Indicador 2.3 sub-denominador - Personas que reciben una prueba rutinaria de carga viral entre las que reciben tratamiento antirretroviral.

2.4 Enfermedad por VIH en estado avanzado y diagnóstico tardío del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Sistemas de información de laboratorios

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Se dispone por separado de datos sobre los recuentos de células CD4 (o porcentajes en el caso de los niños) en personas que viven con el VIH en el momento del diagnóstico inicial y del inicio/reinicio del tratamiento?: Sí

Personas que viven con el VIH con recuentos de CD4 <200 células/mm³ (o <15% para los niños) - en el momento del diagnóstico inicial o del inicio/reinicio del tratamiento antirretrovírico

	Todos los hombres + mujeres + niños	Hombres (15+) con CD4 <200 células/mm ³	Mujeres (15+) con CD4 <200 células/mm ³	Niños menores de 5 años que viven con el VIH	Niños de 5 a 14 años con CD4 <200 células/mm ³ o <15%
Percentage (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con CD4 <200 células/mm ³ (o <15% para niños de 5 a 14 años, todos los niños <5 años que viven con el VIH) en el momento del diagnóstico inicial o del inicio/reinicio de la TAR durante el periodo de notificación.					
Numerador : Número de personas que viven con el VIH con CD4 <200 células/mm ³ (o <15% para niños de 5 a 14 años, todos los niños <5 años que viven con el VIH) en el momento del diagnóstico inicial o del inicio/reinicio del TAR.					
Denominador : Número de personas que viven con el VIH con CD4 medidos en el plazo de 1 mes tras el diagnóstico inicial o el inicio/reinicio de la terapia antirretrovírica					

Distribución del recuento de células CD4 en adultos (mayores de 15 años) por sexo - en el momento del diagnóstico inicial o del inicio/reinicio del tratamiento antirretrovírico

	Todos aquellos a los que se les ha medido el recuento de CD4	CD4 <200 células/mm ³	CD4 200-<350 células/mm ³	CD4 350-<500 células/mm ³	CD4 ≥500 células/mm ³
Número de varones (15+) que viven con el VIH con CD4 por categoría en el momento del diagnóstico inicial o del inicio/reinicio del TAR					
Número de mujeres (15+) que viven con el VIH con CD4 por categoría en el momento del diagnóstico inicial o del inicio/reinicio del TAR					

Distribución y porcentajes del recuento de células CD4 en niños de 5 a 14 años, en el momento del diagnóstico inicial o del inicio o restablecimiento del tratamiento antirretrovírico.

	Todos aquellos a los que se les ha medido el recuento de CD4	CD4 <200 células/mm ³	CD4 200-<350 células/mm ³	CD4 350-<500 células/mm ³	CD4 ≥500 células/mm ³	Todos con % CD4 medido	CD4 <15%	CD4 ≥15%
Número de niños que viven con el VIH con CD4 por categoría en el momento del diagnóstico inicial o del inicio/reinicio del TAR								

Personas que viven con el VIH con CD4 <200 células/mm³ (o <15% en el caso de los niños) - en el momento del diagnóstico inicial

	Todos los hombres + mujeres + niños	Hombres (15+) con CD4 <200 células/mm ³	Mujeres (15+) con CD4 <200 células/mm ³	Niños menores de 5 años que viven con el VIH	Niños de 5 a 14 años con CD4 <200 células/mm ³ o <15%
Percentage (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con CD4 <200 células/mm ³ (o <15% para niños, todos los niños <5 años que viven con el VIH) en el momento del diagnóstico inicial durante el periodo de notificación	37.5	38.1	37.3	0	25
Numerador : Número de personas que viven con el VIH con CD4 <200 células/mm ³ (o <15% para niños de 5 a 14 años, todos los niños <5 años que viven con el VIH) en el momento del diagnóstico inicial.	531	404	125	0	2
Denominador : Número de personas que viven con el VIH con CD4 medidos en el plazo de 1 mes tras el diagnóstico inicial	1416	1061	335	12	8
Denominador 2 : Número de personas que viven con el VIH diagnosticadas de VIH durante el periodo que se reporta	1651	1225	398	18	10

Personas que viven con el VIH con CD4 <200 células/mm³ (o <15% en el caso de los niños) - al iniciar o reiniciar la terapia antirretrovírica.

	Todos los hombres + mujeres + niños	Hombres (15+) con CD4 <200 células/mm ³	Mujeres (15+) con CD4 <200 células/mm ³	Niños menores de 5 años que viven con el VIH	Niños de 5 a 14 años con CD4 <200 células/mm ³ o <15%
Percentage (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con CD4 <200 células/mm ³ (o <15% para niños, todos los niños <5 años que viven con el VIH) al inicio/reinicio del TAR durante el periodo de notificación	36.1	36.6	35.6	0	25
Numerador : Número de personas que viven con el VIH con CD4 <200 células/mm ³ (o <15% para los niños de 5 a 14 años, todos los niños <5 años que viven con el VIH) al inicio/reinicio del TAR.	438	338	98	0	2
Denominador : Número de personas que viven con el VIH con CD4 medidos en el plazo de 1 mes desde el inicio/reinicio de la terapia antirretrovírica	1214	923	275	8	8
Denominador 2 : Número de personas que viven con el VIH que inician/reinician la terapia antirretrovírica durante el periodo que se reporta	1837	1359	448	16	14

Distribución de los recuentos de células CD4 en adultos (mayores de 15 años) por sexo - en el momento del diagnóstico inicial

	Todos aquellos a los que se les ha medido el recuento de CD4	CD4 <200 células/mm3	CD4 200-<350 células/mm3	CD4 350-<500 células/mm3	CD4 ≥500 células/mm3
Número de varones que viven con el VIH con CD4 por categoría en el momento del diagnóstico inicial	1061	404	246	208	203
Número de mujeres seropositivas con CD4 por categoría en el momento del diagnóstico inicial	335	125	78	57	75

Distribución de los recuentos de células CD4 en adultos (mayores de 15 años) por sexo - en el momento del inicio/reinicio del tratamiento antirretrovírico.

	Todos aquellos a los que se les ha medido el recuento de CD4	CD4 <200 células/mm3	CD4 200-<350 células/mm3	CD4 350-<500 células/mm3	CD4 ≥500 células/mm3
Número de varones que viven con el VIH con CD4 por categoría al inicio/reinicio del TAR	923	338	219	185	181
Número de mujeres que viven con el VIH con CD4 por categoría al inicio/reinicio del TAR.	275	98	65	48	64

Distribución de los recuentos y porcentajes de células CD4 entre los niños de 5 a 14 años en el momento del diagnóstico inicial

	Todos aquellos a los que se les ha medido el recuento de CD4	CD4 <200 células/mm3	CD4 200-<350 células/mm3	CD4 350-<500 células/mm3	CD4 ≥500 células/mm3	Todos con % CD4 medido	CD4 <15%	CD4 ≥15%
Número de niños seropositivos con CD4 por categoría en el momento del diagnóstico inicial	8	2	0	2	4			

Distribución y porcentajes del recuento de células CD4 entre niños de 5 a 14 años - al inicio/reinicio del tratamiento antirretroviral

	Todos aquellos a los que se les ha medido el recuento de CD4	CD4 <200 células/mm3	CD4 200-<350 células/mm3	CD4 350-<500 células/mm3	CD4 ≥500 células/mm3	Todos con % CD4 medido	CD4 <15%	CD4 ≥15%
_ : Número de niños que viven con el VIH con CD4 por categoría al inicio/reinicio del TAR	8	2	0	2	4			

2.5 Volumen y positividad de la prueba del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Los registros del programa de servicios de pruebas para el VIH, los diarios y formularios de notificación

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Proporcione cualquier información sobre campañas de pruebas nacionales o cambios en las estrategias de pruebas que puedan explicar cualquier cambio en el volumen de prueba en comparación con años anteriores.:

Datos de las tasas de repetición de pruebas en personas VIH-negativas y VIH-positivas:

Total y desglose por edad

	Todos	Niños (<15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural	0.9	1.8	0.9	1.1
Numerador : Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)	1651	26	1226	399
Denominador : Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)	176923	1446	139699	35778

Por modalidad de prueba: Pruebas a nivel de instalaciones

	Todas las pruebas a nivel de instalaciones	Prueba iniciada por el proveedor en clínicas o instalaciones de emergencia	Clínicas de atención prenatal (incluyendo el embarazo y el parto)	Centros de asesoramiento y pruebas voluntarias (incluyen las instalaciones sanitarias)	Clínicas de TB	Clínica de planificación familiar	Otras pruebas a nivel de instalaciones
Porcentaje (%) : Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural							
Numerador : Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)							
Denominador : Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)							

Por modalidad de prueba: Reporte de servicios de pruebas para el VIH a nivel de comunidad

	Todos los reportes de servicios de pruebas para el VIH a nivel de comunidad	Pruebas móviles	Centros de asesoramiento y pruebas voluntarias (no incluyen las instalaciones sanitarias)	Otras pruebas basadas en la comunidad
Porcentaje (%) : Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural				
Numerador : Número de pruebas efectuadas para las cuales se notifica un resultado VIH-positivo a una persona (positividad)				
Denominador : Número de pruebas efectuadas para las cuales la persona recibe los resultados (volumen de pruebas)				

Autodiagnóstico

	Valor de datos
Cantidad suministrados : Cantidad de equipos de autodiagnóstico adquiridos (no distribuidos o utilizados) por el gobierno en un año, incluyendo (entre otros) los donados	
Cantidad distribuidos : Número total de equipos individuales de autodiagnóstico distribuidos en un año	

2.6A Cobertura de terapias antirretrovirales entre profesionales del sexo que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de profesionales del sexo que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

2.6B Cobertura de terapias antirretrovirales entre los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
Numerador : Número de los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores			
Denominador : Número de los hombres que tienen relaciones con hombres y que viven con el VIH			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

2.6C Cobertura de terapias antirretrovirales entre personas que consumen drogas inyectables y que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que consumen drogas inyectables que viven con el VIH y que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables y que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de personas que usan drogas inyectables y que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

2.6D Cobertura de terapias antirretrovirales entre las personas transgénero que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de las personas transgénero que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de las personas transgénero que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres transgénero - Numerador	Hombres transgénero - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otro - Numerador	Otro - Denominador	Hombres transgénero (<25) - Numerador	Hombres transgénero (<25) - Denominador	Mujeres transgénero (<25) - Numerador	Mujeres transgénero (<25) - Denominador	Otro (<25) - Numerador	Otro (<25) - Denominador
Asunción												

2.6E Cobertura de terapias antirretrovirales entre las personas en prisiones y otros entornos cerrados que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas en prisión que viven con el VIH que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Numerador : Número de los personas en prisión que viven con el VIH que declaran haber estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores						
Denominador : Número de los personas en prisión que viven con el VIH						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Total - Numerador	Total - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Desglose por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

2.7 Mortalidad relacionada con el Sida

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Especifique::

Todas las edades

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Tasa : Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total independientemente del estado serológico respecto del VIH				

< 5 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades <5 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replac por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades <5 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total (de edades <5 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

5-14 años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades 5-14 años) que han muerto por causas relacionadas con el Replac por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades 5-14 años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total (de edades 5-14 años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

15+ años

	Total	Hombres	Mujeres	Sexo desconocido
Indice : Número total de personas (de edades 15 o más años) que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas				
Numerador : Número de personas (de edades 15 o más años) que murieron por causas relacionadas con el sida en el año natural				
Denominador : Población total (de edades 15 o más años) independientemente del estado serológico respecto del VIH				

2.8 Gestión de la infección criptocócica

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Todos
A - Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH con CD4 < 200 células/mm3 que recibieron tratamiento para la infección criptocócica entre los que dieron positivo en las pruebas.	
B - Porcentaje (%) : Porcentaje de personas seropositivas con CD4 < 200 células/mm3 diagnosticadas de infección criptocócica.	
C - Porcentaje (%) : Porcentaje de personas seropositivas con CD4 < 200 células/mm3 que fueron sometidas a pruebas de detección de la infección criptocócica.	
Numerador A : Número de personas seropositivas con CD4 < 200 células/mm3 que dieron positivo en la prueba de la infección criptocócica y recibieron tratamiento	
Numerador B y Denominador A : Número de personas seropositivas con CD4 < 200 células/mm3 que dieron positivo en las pruebas de infección criptocócica	
Numerador C y Denominador B : Número de personas seropositivas con CD4 < 200 células/mm3 que dieron positivo en las pruebas de infección criptocócica	
Dénominateur C : Número de personas que viven con el VIH con CD4 < 200 células/mm3	

3.1 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente:

Si la respuesta es «Otras», especifique:

	Todas las mujeres embarazadas	Todas las mujeres que se inyectan drogas (opcional)
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que conocen su estado respecto al VIH		
Numerador : Número de mujeres embarazadas que acuden a un centro de atención prenatal y/o que dan a luz en un centro sanitario que se habían hecho pruebas del VIH durante el embarazo, o bien ya sabían que eran VIH-positivas en la primera visita de asistencia prenatal.		
1. Infección por el VIH conocida (positiva) al registrarse en la clínica prenatal		
2. Con resultado positivo para VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo o el parto. Esto excluye a las mujeres que ya conocían su estado positivo de VIH antes del embarazo actual.		
3. Con resultado negativo para VIH en el centro de atención prenatal durante el embarazo actual o el parto. Esto debe basarse en los últimos resultados de pruebas en caso de repetición de la prueba.		
Subtotal : Número total de mujeres seropositivas identificadas (1+2)		
Denominador basado en la población : Número de mujeres embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses		
Denominador basado en el programa : Número de mujeres embarazadas que acudieron a un centro de atención prenatal o dieron a luz en un centro sanitario en los últimos 12 meses		

3.2 Diagnóstico temprano en los recién nacidos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Numerador: Laboratorios de pruebas para el diagnóstico infantil precoz

Otra herramienta/fuente de medición:: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Herramienta/fuente de medición: Otros (especificar)

Si la respuesta es «Otras», especifique:: Spectrum

Tomar el denominador del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de hijos de madres seropositivas que recibieron una prueba virológica del VIH en sus dos primeros meses de vida	79.9
Numerador : Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida, durante el periodo de presentación de informes. Los lactantes examinados solo deben contarse una vez. El numerador no debe incluir lactantes estudiados después de dos meses.	183
Resultado de la prueba - Positivo	1
Resultado de la prueba - Negativo	176
Resultado de la prueba - Indeterminado	5
Resultado de la prueba - Rechazado por el laboratorio	1
Resultado de la prueba - Otro	0
Denominador : Número de mujeres seropositivas embarazadas que dieron a luz en los últimos 12 meses	

3.3 Transmisión vertical del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especificar)

Otra herramienta/fuente de medición: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente:

Si la respuesta es «Otras», especifique:

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje estimado de niños recién infectados por el VIH por transmisión vertical entre las mujeres que viven con el VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	
Numerador : Número estimado de niños recién infectados por el VIH en los últimos 12 meses por transmisión vertical	
Denominador : Número estimado de partos en mujeres con el VIH en los últimos 12 meses	

3.4 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Otra herramienta/fuente de medición: Spectrum

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique)

Si la respuesta es «Otras», especifique: Spectrum

Tomar los datos del archivo final de Spectrum: Sí

Si la respuesta es negativa, especifíquese la fuente::

Si la respuesta es «Otras», especifique::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión vertical del VIH	
Numerador : Número de mujeres embarazadas que viven con el VIH que dieron a luz durante los últimos 12 meses y recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión vertical del VIH Los informes mundiales que resumen la cobertura de los medicamentos antirretrovirales para prevenir la transmisión materno-infantil excluirán a las mujeres que hayan recibido nevirapina en una sola dosis, ya que se considera un régimen subóptimo. Sin embargo, el país debe informar el número de mujeres que sólo recibieron nevirapina en dosis única. Este recuento debe incluir a todas las mujeres que hayan dado a luz en los últimos 12 meses, independientemente del año en que comenzaron con medicamentos antirretrovirales.	
1. Iniciaron de la terapia antirretrovírica durante el embarazo	
2. Ya seguían la terapia antirretrovírica antes del embarazo actual	
3. Otras En el cuadro de Comentario, para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes.	
Si no existen datos desglosados para 1 y 2, facilite el número total de mujeres embarazadas que reciben terapias antirretrovirales para toda la vida	
Denominador : Número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz en los últimos 12 meses	

Para las mujeres que reciban "Otro" régimen, describa el régimen antirretroviral y el número de mujeres que recibe cada categoría de dichos regímenes:

3.5 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Datos del programa nacional

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

:

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:

Tipo de prueba (o pruebas) usada por lo general en su país para definir si una mujer embarazada da positivo::

No treponémica (RPR, VDRL), Treponémica (pruebas rápidas, TPPA)

A. Casos de sífilis entre mujeres embarazadas

En cualquier consulta de atención prenatal

	Todos	15-24	25+
Porcentaje (%) : Cobertura de pruebas sobre sífilis en mujeres que recibieron servicios de atención prenatal (en cualquier visita)	72.6		
Numerador : Número de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a pruebas de sífilis	105391		
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal	145105		

En la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)

	Total
Porcentaje (%) : Cobertura de pruebas de sífilis en mujeres que recurren a servicios de atención prenatal en la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
Numerador : Número de mujeres que recurren a servicios de atención prenatal y que se sometieron a la prueba de sífilis durante la primera visita prenatal (<13 semanas de gestación)	
Denominador : Número de mujeres que acudieron a servicios de atención prenatal.	

B. Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva

	Todos	15-24	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a servicios de atención prenatal con una serología de sífilis (reactiva) positiva	2.4		
Numerador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal con un resultado positivo para la sífilis	2498		
Denominador : Número de pacientes que acuden a clínicas de atención prenatal que se realizaron las pruebas de sífilis	105391		

C. Porcentaje de mujeres que acuden a servicios de atención prenatal durante un determinado periodo con serología de sífilis positiva que recibieron tratamiento adecuado

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una serología de sífilis positiva que recibieron un tratamiento adecuado	65.9
Numerador : Número de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una serología de sífilis positiva y que recibieron al menos una dosis de penicilina benzatina 2,4 mU por vía intramuscular	1645
Denominador : Número de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una serología positiva para la sífilis	2498

3.6 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos)

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Notificación de casos nacional

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

¿Incluye su definición de casos para la sífilis congénita los partos de mortinatos?: No

Los países deben comentar si existen grandes diferencias entre la definición nacional de casos y la definición de casos de vigilancia mundial, disponible en la página 13 de:

<https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emtct-hiv-syphilis/en>:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)	0.4
Numerador : Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos) en los últimos 12 meses.	544
Denominador : Número de nacimientos	145105

3.7 Casos de hepatitis B entre mujeres embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Datos del programa nacional

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Son los datos representativos de todo el país?: Sí

En caso negativo, sírvase describir la representatividad de los datos:

A. Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a la prueba del antígeno de superficie del VHB (HBsAg)

	Todos	15-24	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a la prueba del antígeno de superficie del VHB (HBsAg)	59.8		
Numerador : Número de mujeres embarazadas que acudieron a los servicios de atención prenatal y se sometieron a la prueba del HBsAg	86806		
Denominador : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal	145105		

B. Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y que se someten a la prueba del HBsAg y tienen un resultado positivo

	Todos	15-24	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal que se someten a la prueba del HBsAg y que dan un resultado positivo	0.2		
Numerador : Número de mujeres embarazadas que acudieron a los servicios de atención prenatal y dieron positivo en la prueba del HBsAg	133		
Denominador : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal y se someten a la prueba del HBsAg	86806		

C. Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una prueba de HBsAg positiva y que reciben pruebas adicionales de ADN del VHB o, cuando no se dispone de ellas, del antígeno de la envoltura del VHB (HBeAg)

	Todos	15-24	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal con una prueba de HBsAg positiva y que reciben una prueba adicional de ADN del VHB o, cuando no se dispone de ella, del antígeno de la envoltura del VHB (HBeAg)			
Numerador : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal con un HBsAg positivo y que luego reciben pruebas de ADN del VHB y/o HBeAg			
Denominador : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal y que dan positivo al HBsAg			

D. Porcentaje de mujeres elegibles que acuden a los servicios de atención prenatal y que fueron tratadas según la política nacional, de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

	Todos	15-24	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres que acuden a los servicios de atención prenatal y que son tratadas según la política nacional, de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)			
Numerador : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal que cumplen los criterios de elegibilidad y reciben tratamiento antivírico			
Denominador : Número de mujeres embarazadas que acuden a los servicios de atención prenatal y que cumplen los requisitos para recibir tratamiento antivírico			

4.1A Experiencia de violencia sexual y/o física entre los trabajadores del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Trabajadores del sexo que declararon que cualquiera de los incidentes les había ocurrido al menos una vez en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que declararon haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que declararon haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de trabajadores del sexo encuestados						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Area type	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todos - Numerador	Todos - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Ventilados por género

Area name	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

4.1B Experiencia de violencia sexual y/o física entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declararon que cualquiera de los incidentes les ocurrió al menos una vez en los últimos 12 meses

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declararon que alguno de los incidentes les había ocurrido en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que respondieron			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Pourcentage (%)	Tous - Numérateur	Tous - Dénominateur	<25 - Numérateur	<25 - Dénominateur	25+ - Numérateur	25+ - Dénominateur
Ciudad/Ciudad	Asunción								

4.1C Experiencia de violencia sexual y/o física entre las personas que se inyectan drogas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Personas que se inyectan drogas que declararon que cualquiera de los incidentes les ocurrió al menos una vez en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que se inyectan drogas que declaran haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que se inyectan drogas que declaran haber sufrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de personas que se inyectan drogas encuestadas						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todos - Numerador	Todos - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Ventilados por género

Area name	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

4.1D Experiencia de violencia sexual y/o física entre personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Personas transgénero que declararon que cualquiera de los incidentes les había ocurrido al menos una vez en los últimos 12 meses

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que declararon que les había ocurrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas transgénero que declararon que les había ocurrido alguno de los incidentes en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de personas transgénero encuestadas						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todos - Numerador	Todos - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Ventilados por género

Nombre de área	Hombres trans - Numerador	Hombres trans - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otros - Numerador	Otros - Denominador	Hombres trans (<25) - Numerador	Hombres trans (<25) - Denominador	Mujeres transexuales (<25) - Numerador	Mujeres trans (<25) - Denominador	Otros (<25) - Denominador	Otros (<25) - Denominador
Asunción												

4.2 Actitudes hacia la violencia contra las mujeres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que están de acuerdo con al menos una de las afirmaciones									
Numerador : Número de encuestados que están de acuerdo con al menos una de las afirmaciones									
Denominador : Número total de encuestados									

4.3 Servicios de VIH que responden a las cuestiones de género

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Sample size - Number of Survey Respondents:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de centros sanitarios que prestan servicios relacionados con el VIH sensibles al género	
Numerador : Número de centros sanitarios que prestan servicios de VIH con perspectiva de género	
Denominador : Número de centros sanitarios que prestan servicios de VIH encuestados	

6.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Respuestas "No" a la pregunta número 1 "¿Compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 1									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 1									

Herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 (si es diferente de la fuente de medición indicada más arriba):

Si la herramienta/fuente de medición de datos para la Pregunta 2 es "otra", especifíquela:

Respuestas "No" a la pregunta número 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" a la pregunta 2									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									
Respondieron "No lo sé", "No estoy seguro" o "Depende" : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondió "no lo sé", "no estoy seguro", o "depende" a la pregunta 2									

Indicador compuesto: Respondieron "No" a la pregunta 1, a la pregunta 2 o a ambas preguntas (solamente se debe completar esta tabla si los datos para la pregunta 1 y la pregunta 2 son de la misma fuente).

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" al menos a una de las dos preguntas									
Numerador : Número de entrevistados (de 15 a 49 años) que respondieron "No" al menos a una de las dos preguntas									
Denominador : Número de entrevistados de 15 a 49 años que han oído hablar del VIH									

6.2 Estigma interiorizado que declaran las personas que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de encuestados:

I. Encuesta de población

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con la afirmación									
Numerador : Número de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con la afirmación									
Denominador : Número de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH									

II. Encuesta sobre el índice de estigmatización de las personas que viven con el VIH

¿Ha elegido la Encuesta del Índice de Estigma de las Personas que Viven con el VIH como su herramienta/fuente de medición de datos?:

Desglose por sexo y edad

	Todos	Hombres (18+)	Hombres (18-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (18+)	Mujeres (18-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
Percentage (%) : Porcentaje de encuestados que están de acuerdo con la afirmación											
Numerador : Número de encuestados que están de acuerdo con la afirmación											
Denominador : Número de encuestados											

Desglose por sexo y edad (continuación)

	Transgénero (hombre y mujer, 18+)	Transgénero (hombre y mujer, 18-19)	Transgénero (hombre y mujer, 20-24)	Transgénero (hombre y mujer, 25-49)	Transgénero (hombre y mujer, 50+)	Otro (total)	Prefiere no decirlo
Percentage (%) : Porcentaje de encuestados que están de acuerdo con la afirmación							
Numerador : Número de encuestados que están de acuerdo con la afirmación							
Denominador : Número de encuestados							

Desglose por grupos de población clave

	hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Transgénero (hombre y mujer)	Personas que se inyectan drogas
Percentage (%) : Porcentaje de encuestados que están de acuerdo con la afirmación				
Numerador : Número de encuestados que están de acuerdo con la afirmación				
Denominador : Número de encuestados				

6.3 Estigma y discriminación que sufren las personas que viven con el VIH en entornos comunitarios

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de encuestados:

I. Encuesta basada en la población

	Todos	Hombres (15-49)	Hombres (15-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Mujeres (15-49)	Mujeres (15-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados (de 15 años o más) que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con una o más de las experiencias									
Numerador : Número de personas que viven con el VIH que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH y que están de acuerdo con una o más de las tres experiencias que les han ocurrido por su condición de seropositivos en los últimos 12 meses									
Denominador : Número de encuestados que declaran haber recibido un resultado positivo en la prueba del VIH									

II. Encuesta sobre el índice de estigmatización de las personas que viven con el VIH

Desglose por sexo y edad

	Todos	Hombres (18+)	Hombres (18-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (18+)	Mujeres (18-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados (de 18 años o más) que están de acuerdo en que una o más de las ocho experiencias les ocurrieron debido a su estado serológico respecto al VIH en los últimos 12 meses											
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH y que están de acuerdo en que una o más de las ocho experiencias les ocurrieron debido a su condición de seropositivos en los últimos 12 meses											
Denominador : Número de encuestados											

Desglose por sexo y edad (continuación)

	Transgénero (hombre y mujer, 18+)	Transgénero (hombre y mujer, 18-19)	Transgénero (hombre y mujer, 20-24)	Transgénero (hombre y mujer, 25-49)	Transgénero (hombre y mujer, 50+)	Otro (total)	Prefiere no decirlo
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados (de 18 años o más) que están de acuerdo en que una o más de las ocho experiencias les ocurrieron debido a su estado serológico respecto al VIH en los últimos 12 meses							
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH y que están de acuerdo en que una o más de las ocho experiencias les ocurrieron debido a su condición de seropositivos en los últimos 12 meses							
Denominador : Número de encuestados							

Desglose por grupos de población clave

	hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Transgénero (hombre y mujer)	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados (de 18 años o más) que están de acuerdo en que una o más de las ocho experiencias les ocurrieron debido a su estado serológico respecto al VIH en los últimos 12 meses				
Numerador : Número de encuestados que viven con el VIH y que están de acuerdo en que una o más de las ocho experiencias les ocurrieron debido a su condición de seropositivos en los últimos 12 meses				
Denominador : Número de encuestados				

6.4 Experiencia de discriminación relacionada con el VIH en entornos de atención de la salud

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Desagregados por tipo de servicio de salud

	Servicios de salud relacionados con el VIH	Servicios de salud no relacionados con el VIH	Cualquier servicio de salud
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de encuestados			

Numerador - desglosado por tipo de estigma y discriminación experimentado

	Servicios de salud relacionados con el VIH	Servicios de salud no relacionados con el VIH	Cualquier servicio de salud
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Negación de atención debido al estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Se les aconseja no tener relaciones sexuales debido a su estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Hablaron mal o murmuraron acerca de la situación del VIH"			
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso verbal debido a la condición de VIH"			
Número de personas que respondieron afirmativamente a: "Abuso físico debido a la condición de VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Evitar el contacto físico debido al estado serológico respecto al VIH"			
Número de personas que respondieron "Sí" a: "Informar a otros sobre el estado serológico respecto al VIH sin consentimiento"			

Cualquier servicios de salud: desagregados por género y edad

	Hombres	Mujeres	Transgénero (hombre y mujer)	18-19	20-24	25-49	50+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses							
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses							
Denominador : Número de encuestados							

Desagregado por población clave

	hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Profesionales del sexo	Transgénero (hombre y mujer)	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses				
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses				
Denominador : Número de encuestados				

Todos los servicios sanitarios - desglosados por tiempo de seropositividad

	0-1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15+ años
Percentage (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH que informan haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 12 meses					
Numerador : Número de personas que respondieron afirmativamente al haber experimentado al menos una de las siguientes formas de estigma y discriminación en los últimos 12 meses					
Denominador : Número de encuestados					

LAC4.1.1 Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Número de actos de violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) reportados en los últimos 12 meses

	Todos	<25	25+
Todos			
Lesbianas			
Hombres gay			
Hombres bisexuales			
Mujeres bisexuales			
Hombres trans			
Mujeres trans			
Personas intersexuales			

Datos sub-nacionales

Sitio	Todos	Lesbianas	Hombres gay	Hombres bisexuales	Mujeres bisexuales	Hombres trans	Mujeres trans	Personas intersexuales
-------	-------	-----------	-------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	------------------------

LAC5.1.1 Violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses

	Todos	Personas que viven con el VIH	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas que se inyectan drogas	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Porcentaje de denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y las poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de casos denunciados de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave que se han resuelto en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de casos de violaciones de derechos humanos hacia personas que viven con VIH y poblaciones clave informadas en los últimos 12 meses						

Datos sub-nacionales

Sitio	Porcentaje - Todos	Porcentaje - Personas que viven con VIH	Porcentaje - Profesionales del sexo	Porcentaje - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Porcentaje - Usuarios de drogas inyectables	Porcentaje - Personas transgénero

6.5A Estigma y discriminación que sufren las trabajadoras del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Trabajadoras del sexo que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
Denominador : Número total de trabajadores del sexo encuestados						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Area type	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todos - Numerador	Todos - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Ventilados por sexo

Area name	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

6.5B Estigma y discriminación que sufren los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber tenido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que declaran haber tenido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses			
Denominador : Número total de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres encuestados			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todos - Numerador	Todos - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

6.5C Estigma y discriminación que sufren las personas que usan drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Personas que se inyectan drogas que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que se inyectan drogas que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
Numerador : Número de personas que se inyectan drogas que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
Denominador : Número total de personas que se inyectan drogas encuestadas						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todos - Numerador	Todos - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Ventilados por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

6.5D Estigma y discriminación que sufren las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Especifique la estrategia de muestreo y la ubicación:

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Personas transgénero que declaran haber sufrido estigma y discriminación en los últimos 6 meses

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
Numerador : Número de personas transgénero que declaran que les ha ocurrido una o más de las tres experiencias en los últimos 6 meses						
Denominador : Número total de personas transgénero encuestadas						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todos - Numerador	Todos - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Ventilados por sexo

Nombre de área	Hombres trans - Numerador	Hombres trans - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otros - Numerador	Otros - Denominador	Hombres trans (<25) - Numerador	Hombres trans (<25) - Denominador	Mujeres transexuales (<25) - Numerador	Mujeres trans (<25) - Denominador	Otros (<25) - Denominador	Otros (<25) - Denominador
Asunción												

6.6A Evitación de los servicios de salud por parte de los profesionales del sexo por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de profesionales del sexo que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de encuestados						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todos - Numerador	Todos - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Ventilados por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

6.6B Evitación de los servicios de salud por parte de los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Numerador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses			
Denominador : Número de encuestados			

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todos - Numerador	Todos - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

6.6C Evitación de los servicios de salud por parte de las personas que usan drogas inyectables por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que usan drogas inyectables y evitaron buscar asistencia sanitaria en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas que usan drogas inyectables que informaron haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de encuestados						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todos - Numerador	Todos - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Ventilados por sexo

Nombre de área	Hombres - Numerador	Hombres - Denominador	Mujeres - Numerador	Mujeres - Denominador	Transgénero - Numerador	Transgénero - Denominador	Hombres (<25) - Numerador	Hombres (<25) - Denominador	Mujeres (<25) - Numerador	Mujeres (<25) - Denominador	Transgénero (<25) - Numerador	Transgénero (<25) - Denominador
Asunción												

6.6D Evitación de los servicios de salud por parte de las personas transgénero por causa del estigma y la discriminación

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?:

Tamaño de la muestra - Número de entrevistados en la encuesta:

Evitación de la atención sanitaria

Motivo de anulación incluido en la pregunta de la encuesta:

Plazos incluidos en la pregunta de la encuesta:

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero que evitaron buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de personas transgénero que declaran haber evitado buscar atención médica en los últimos 12 meses						
Denominador : Número de encuestados						

Datos sub-nacionales

Total y desglose por edad

Tipo de área	Nombre de área	Tamaño de la muestra	Porcentaje (%)	Todos - Numerador	Todos - Denominador	<25 - Numerador	<25 - Denominador	25+ - Numerador	25+ - Denominador
Ciudad/Ciudad	Asunción								

Ventilados por sexo

Nombre de área	Hombres trans - Numerador	Hombres trans - Denominador	Mujeres transgénero - Numerador	Mujeres transgénero - Denominador	Otros - Numerador	Otros - Denominador	Hombres trans (<25) - Numerador	Hombres trans (<25) - Denominador	Mujeres transexuales (<25) - Numerador	Mujeres trans (<25) - Denominador	Otros (<25) - Denominador	Otros (<25) - Denominador
Asunción												

6.7 Personas que viven con el VIH que buscan reparación por la violación de sus derechos

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Personas que viven con el VIH que informan de abusos de derechos en los últimos 12 meses y que declaran haber buscado reparación

Personas que viven con el VIH que informan de abusos de derechos en los últimos 12 meses y que declaran haber buscado reparación

	Todos	Hombres (18+)	Hombres (18-19)	Hombres (20-24)	Hombres (25-49)	Hombres (50+)	Mujeres (18+)	Mujeres (18-19)	Mujeres (20-24)	Mujeres (25-49)	Mujeres (50+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que experimentaron abusos de derechos y buscaron reparación											
Numerador : Número de encuestados que sufrieron abusos de derechos y buscaron reparación											
Denominador : Número total de encuestados que sufrieron abusos de derechos											

Personas que viven con el VIH que informan de abusos de derechos en los últimos 12 meses y que declaran haber buscado reparación

	Transgénero (hombre y mujer, 18+)	Transgénero (hombre y mujer, 18-19)	Transgénero (hombre y mujer, 20-24)	Transgénero (hombre y mujer, 25-49)	Transgénero (hombre y mujer, 50+)	Otro (total)	Prefiere no decirlo
Porcentaje (%) : Porcentaje de encuestados que experimentaron abusos de derechos y buscaron reparación							
Numerador : Número de encuestados que sufrieron abusos de derechos y buscaron reparación							
Denominador : Número total de encuestados que sufrieron abusos de derechos							

Desglose por grupos de población clave

	Profesionales del sexo	hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas que se inyectan drogas	Transgénero (hombre y mujer)
Number of respondents who experienced rights abuses and sought redress				

Desglose por tipo de siniestro

	Formal (presentó una denuncia y/o contactó con un abogado)	Informal (contactó con un político se pronunció públicamente y/o se puso en contacto con una organización/red comunitaria de personas que viven con el VIH para obtener apoyo)	Otro
Number of respondents who experienced rights abuses and sought redress			

6.8 Actitudes discriminatorias del personal de centros de salud hacia las personas que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Sample size - Number of Survey Respondents:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de personal sanitario que reporta actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH	
Numerador : Número de encuestados que estaban de acuerdo con alguna de las tres primeras afirmaciones y/o en desacuerdo con la cuarta afirmación	
Denominador : Número de encuestados	

6.9A Actitudes discriminatorias hacia los profesionales del sexo entre el personal sanitario

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Sample size - Number of Survey Respondents:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de personal sanitario que reporta actitudes discriminatorias hacia los profesionales del sexo	
Numerador : Número de encuestados que están de acuerdo con la afirmación	
Denominador : Número de encuestados	

6.9B Actitudes discriminatorias hacia los gays y otros hombres que tienen sexo con hombres entre el personal sanitario

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Sample size - Number of Survey Respondents:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de personal sanitario que reporta actitudes discriminatorias hacia los homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	
Numerador : Número de encuestados que están de acuerdo con la afirmación	
Denominador : Número de encuestados	

6.9C Actitudes discriminatorias hacia los usuarios de drogas inyectables entre el personal sanitario

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Sample size - Number of Survey Respondents:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de personal de centros sanitarios que reportan actitudes discriminatorias hacia personas que se inyectan drogas que tienen sexo con hombres	
Numerador : Número de encuestados que están de acuerdo con la afirmación	
Denominador : Número de encuestados	

6.9D Actitudes discriminatorias hacia los transexuales entre el personal sanitario

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Sample size - Number of Survey Respondents:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de personal sanitario que reporta actitudes discriminatorias hacia las personas transexuales	
Numerador : Número de encuestados que están de acuerdo con la afirmación	
Denominador : Número de encuestados	

6.10A Actitudes discriminatorias hacia los profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Otro género
Porcentaje (%) : Porcentaje de policías que reportan actitudes discriminatorias hacia las trabajadoras sexuales				
Numerador : Número de encuestados que reportan actitudes discriminatorias				
Denominador : Número de encuestados				

6.10B Actitudes discriminatorias hacia los homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Hombres	Mujeres	Otro género
Porcentaje (%) : Porcentaje de policías que reportan actitudes discriminatorias hacia hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres				
Numerador : Número de encuestados que reportan actitudes discriminatorias				
Denominador : Número de encuestados				

6.10C Actitudes discriminatorias hacia los consumidores de drogas inyectables

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Todos	Hombres	Mujeres	Otro género
Porcentaje (%) : Porcentaje de policías que reportan actitudes discriminatorias hacia las personas que se inyectan drogas				
Numerador : Número de encuestados que reportan actitudes discriminatorias				
Denominador : Número de encuestados				

6.10D Actitudes discriminatorias hacia los transexuales

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Todos	Hombres	Mujeres	Otro género
Porcentaje (%) : Porcentaje de policías que reportan actitudes discriminatorias hacia las personas transexuales				
Numerador : Número de encuestados que reportan actitudes discriminatorias				
Denominador : Número de encuestados				

7.1 Hepatitis vírica entre grupos de población clave

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Estudio especial (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición: Estudio de Prevalencia de VIH, Sífilis Hepatitis B, Hepatitis C conocimientos, prácticas de riesgo y actitudes de hombres que tienen sexo con hombres en Asunción, Central, Alto Paraná y Caaguazú. 2023.

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: HSH Muestra: 1197

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Los datos están ponderados?: No

Hepatitis B

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis B entre grupos de población clave	0	0	0	0	0	0	0	1.3	0
Numerador : Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en la prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B y que también dan positivo en la prueba del VIH	0	0	0	0	0	0	0	16	0
Denominador : Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	1197	0

Hepatitis C

Algoritmo de pruebas para la detección de la hepatitis C:

	Personas que se inyectan drogas - Total	Personas que se inyectan drogas - Hombres	Personas que se inyectan drogas - Mujeres	Personas que se inyectan drogas - Transgénero	Personas que se inyectan drogas - <25	Personas que se inyectan drogas - 25+	Profesionales del sexo	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas transgénero
Porcentaje (%) : Prevalencia de la coinfección por VIH y virus de la hepatitis C entre grupos de población clave	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0
Numerador : Número de personas de un grupo de población clave que dan positivo en anticuerpos del virus de la hepatitis C y que también dan positivo en la prueba del VIH	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Denominador : Número de encuestados que se han sometido a pruebas para tanto el VIH como la hepatitis C	0	0	0	0	0	0	0	1197	0

7.2 Pruebas de hepatitis C

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)						
Numerador : Número de adultos y niños que inician terapias antirretrovirales que fueron sometidas a pruebas para la hepatitis C durante el periodo del que se informa utilizando la secuencia de pruebas sobre anticuerpos anti-VHC seguidas de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa a VHC para quienes sean anti-VHC-positivos						
Denominador : Número de adultos y niños que empiezan terapias antirretrovirales durante el periodo sobre el que se informa						

7.3 Personas coinfectadas con el VIH y el VHC que comienzan el tratamiento contra el VHC

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Personas que se inyectan drogas
Porcentaje (%) : Proporción de personas diagnosticadas con coinfección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC		
Numerador : Número de personas diagnosticadas con VIH y coinfección por el VHC que inician el tratamiento para el VHC durante el periodo de referencia		
Denominador : Número de personas diagnosticadas con VIH y coinfección por el VHC que se inscribieron en la atención del VIH durante el periodo del informe		

7.4A Prevalencia de la sífilis entre profesionales del sexo

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición: Encuesta de Prevalencia del VIH/Sífilis/Hepatitis B/C Comportamientos, Prácticas y Actitudes de la Población MTS (Mujeres Trabajadoras Sexuales) en el Paraguay, 2023.

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Muestra: 902

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Los datos están ponderados?: No

	Todos	Hombres	Mujeres	Transgénero	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa						
Numerador : Número de profesionales del sexo que han tenido resultados positivos en pruebas de detección de sífilis activa			56			
Denominador : Número de profesionales del sexo que se han sometido a pruebas de detección de sífilis activa	902	0	902	0		

Prueba de diagnóstico

Algoritmo de la prueba
Treponémica (pruebas rápidas, TPPA)
No treponémica (RPR, VDRL)

7.4B Prevalencia de la sífilis entre hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición: Estudio de Prevalencia de VIH, Sífilis Hepatitis B, Hepatitis C conocimientos, prácticas de riesgo y actitudes de hombres que tienen sexo con hombres en Asunción, Central, Alto Paraná y Caaguazú. 2023.

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas: Muestra: 1197

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Los datos están ponderados?: No

	Todos	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa	13.6		
Numerador : Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que han recibido resultados positivos en pruebas para la detección de sífilis activa	163		
Denominador : Número de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas para la detección de sífilis activa	1197	535	662

Prueba de diagnóstico

Algoritmo de la prueba
Treponémica (pruebas rápidas, TPPA)
No treponémica (RPR, VDRL)

7.4D Prevalencia de la sífilis entre las personas transgénero

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Otros (especifique la estrategia y el lugar del muestreo)

Otra herramienta/fuente de medición:: ESTUDIO DE LA PREVALENCIA VIH/SIFILIS/Hepatitis B/C Y COMPORTAMIENTOS, PRÁCTICAS Y ACTITUDES DE LA POBLACION TRANS EN EL PARAGUAY. 2023

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:: Muestra: 411

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

¿Los datos están ponderados?: No

	Todos	Hombres transgénero	Mujeres transgénero	Otro	<25	25+
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas transgénero con sífilis	23.5	23.5	0	0	15.1	27.4
Numerador : Número de personas transgénero que dan positivo en las pruebas de sífilis						
Denominador : Número de personas transgénero que se someten a pruebas de sífilis	411	411	0	0		

Prueba de diagnóstico

Algoritmo de la prueba
Treponémica (pruebas rápidas, TPPA)
No treponémica (RPR, VDRL)

7.5 Hombres con secreción uretral

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Son los datos representativos de todo el país?:

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

	Total
Porcentaje (%) : Porcentaje de hombres con secreción uretral en los últimos 12 meses	
Numerador : Número de hombres con secreción uretral durante el periodo de notificación	
Denominador : Número de hombres con 15 o más años de edad	

7.6 Gonorrea entre la población masculina

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición:

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

¿Son los datos representativos de todo el país?:

En caso negativo, indique la representatividad de los datos:

	Total
Índice : Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos	
Numerador : Número de hombres que reportan gonorrea diagnosticados en laboratorio en los anteriores 12 meses	
Denominador : Número de hombres de 15 años de edad o más	

7.7 Terapia combinada de la infección por el VIH y la tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: Otras herramientas (defina a continuación las fuentes de datos para numerador)

Otra herramienta/fuente de medición: Registro consolidado de datos del PRONASIDA y el PNCT de los pacientes con la coinfección TB_VIH Registro de PVV con la coinfección TB-VIH enviados por los SAI Ficha de notificación del seguimiento de casos de TB del PNCT

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Total	Hombres	Mujeres	<15	15+
Numerador : Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte	239	188	51	0	239

Nota: la OMS calcula las estimaciones anuales del número de casos incidentes de tuberculosis en personas que viven con el VIH. Las estimaciones del denominador de 2023, facilitadas por los países sobre la notificación y la cobertura del tratamiento antirretroviral, solo están disponibles desde la segunda mitad del año de notificación y no es necesario incluirlas en el momento de presentar los informes. Las estimaciones de 2022 se pueden consultar en: <http://www.who.int/tb/country/data/download/en/>

7.8 Personas que viven con el VIH con tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros de pacientes que reciben tratamiento antirretrovírico

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Valor de datos
Porcentaje (%) : Número total de personas con VIH con tuberculosis (TB) activa, expresado como el porcentaje de los pacientes que se incluyen por primera vez en el tratamiento para el VIH durante el periodo de notificación	3.8
Numerador : Número total de personas con VIH recién incluidas en tratamiento para el VIH y con TB activa durante el periodo de notificación	70
Denominador : Número total de personas inscritas por primera vez en el tratamiento del VIH (es decir, las que se inscribieron en la terapia antirretrovírica durante el período del informe) Este denominador debe ser el mismo que el del indicador 7.9 para las personas que acaban de recibir terapia antirretroviral	1837

7.9 Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros de pacientes que reciben tratamiento antirretrovírico

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Are data on people NEWLY enrolled on antiretroviral therapy who started tuberculosis preventive treatment available?: Sí

Recién inscritos en la terapia antirretroviral

	Todos	<5 años	5-15 años	15 años o más
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas recién inscritas en la terapia antirretrovírica que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el periodo de referencia	6.2	0	6.3	6.2
Numerador : Número total de personas que viven con el VIH inscritas por primera vez en la terapia antirretrovírica y que también iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el mismo periodo de notificación	113	0	1	112
Denominador : Número total de personas que viven con el VIH inscritas por primera vez en la terapia antirretrovírica (es decir, las inscritas en la terapia antirretrovírica durante el periodo de notificación). Este denominador debe ser el mismo que el del indicador 7.8	1837	16	16	1805

¿Se dispone de nuevos datos sobre las personas que están actualmente en terapia antirretroviral y que han iniciado un tratamiento preventivo contra la tuberculosis?: Sí

Actualmente en terapia antirretroviral

	Todos	<5 años	5-15 años	15 años o más
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el periodo de referencia	1.8	3.2	4.6	1.8
Numerador : Número total de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que iniciaron el tratamiento preventivo contra la tuberculosis durante el periodo del informe	228	1	5	222
Denominador : Número total de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral. Este valor debe ser mayor que el denominador del indicador 7.8	12754	31	108	12615

	Todos	<5 años	5-15 años	15 años o más
Número total de personas actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que han comenzado el tratamiento preventivo de la tuberculosis antes del periodo de notificación				

7.10 Personas que viven con el VIH y que reciben terapia antirretroviral que completaron un ciclo de tratamiento preventivo contra la tuberculosis

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros de pacientes que reciben tratamiento antirretrovírico

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

	Todos	Comenzó con ART en 2020	Comenzó con ART antes de 2020	Niños (0-5)	Niños (5-15)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH en tratamiento antirretroviral que completaron un curso de tratamiento preventivo de la tuberculosis entre los que iniciaron el TPT	100	100	100	0	0	100	100	0
Numerador : Número de personas en terapia antirretroviral que completaron el TPT entre las que iniciaron cualquier ciclo de TPT durante el año anterior, p. ej., cohorte de 2021 para el informe de 2023	21	12	9	0	0	19	2	0
Denominador : Número de personas en tratamiento antirretroviral que iniciaron cualquier ciclo de TPT durante el año anterior (ingrese el mismo año de cohorte que en el numerador: p. ej., 2021 para informes de 2023)	21	12	9	0	0	19	2	0

	6 meses de monoterapia diaria con isoniazida (6H)	9 meses de monoterapia diaria con isoniazida (9H)	36 meses en monoterapia con isoniazida diaria (36H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses de rifapentina más isoniazida semanales (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniazida (3RH)	1 mes con rifapentina diaria más isoniazida (1HP)	Otro
Adultos (15+)	21							
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:								

	6 meses de monoterapia diaria con isoniazida (6H)	9 meses de monoterapia diaria con isoniazida (9H)	4 meses con rifampicina diaria (4R)	3 meses de rifapentina más isoniazida semanales (3HP)	3 meses con rifampicina diaria más isoniazida (3RH)	Otro
Niños (0-14)						
Si es otro, especifique el régimen o los regímenes utilizados:						

7.11 Cáncer de cuello de útero entre las mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Mujeres que viven con el VIH que se han sometido a pruebas de detección del cáncer de cuello uterino

	Total	15-19	20-24	25-29	30-49	50+
Número de mujeres que viven con el VIH que se sometieron a una prueba de detección de cáncer de cuello uterino en los últimos 12 meses, utilizando cualquier método de cribado						
Número de mujeres que viven con el VIH que se sometieron a una prueba de cribado de cáncer de cuello uterino en los últimos 12 meses, utilizando cualquier método de cribado, y que se sometieron a una prueba de cribado por primera vez en su vida						

7.12 Tratamiento del precáncer de cuello uterino para mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Mujeres que viven con el VIH que recibieron tratamiento para lesiones precancerosas después de un cribado positivo para cáncer de cuello uterino en los últimos 12 meses, datos nacionales

	Total	15-19	20-24	25-29	30-49	50+
Porcentaje (%) : Porcentaje de mujeres que viven con el VIH, con resultado positivo en la prueba de detección de cáncer de cuello uterino, que recibieron tratamiento para las lesiones precancerosas en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de mujeres que viven con el VIH que recibieron tratamiento para las lesiones precancerosas después de un cribado positivo para el precáncer de cuello de útero						
Denominador : Número de mujeres que viven con el VIH que dieron positivo en el cribado de precáncer de cuello de útero						

Desagregación del numerador

	Total
Número de mujeres para las que éste fue el primer episodio de tratamiento de lesiones precancerosas en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el segundo episodio de tratamiento de precáncer en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el tercer episodio de tratamiento precanceroso en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el cuarto o más episodio de tratamiento precanceroso en su vida	
Número de mujeres que reciben tratamiento precanceroso con crioterapia	
Número de mujeres que reciben tratamiento contra el precáncer con ablación térmica	
Número de mujeres que reciben tratamiento de las lesiones precancerosas con escisión de gran lazo de la zona de transformación (LLETZ / LEEP)	
Número de mujeres que reciben tratamiento contra el precáncer con otros métodos de tratamiento	

7.13 Tratamiento para el cáncer de cuello de útero invasivo para las mujeres que viven con el VIH

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Mujeres que viven con el VIH con sospecha de cáncer cervical invasivo que fueron tratadas en los últimos 12 meses

	Total	15-19	20-24	25-29	30-49	50+
Porcentaje (%) : El porcentaje de mujeres que viven con el VIH con sospecha de cáncer cervical invasivo que fueron tratadas en los últimos 12 meses						
Numerador : Número de mujeres que viven con el VIH con sospecha de cáncer cervical invasivo que recibieron tratamiento						
Denominador : Número de mujeres que viven con el VIH que se sometieron a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino y tuvieron sospechas de cáncer invasivo						

Desagregación del numerador

	Total
Número de mujeres para las que este fue el primer episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el segundo episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el tercer episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres para las que este fue el cuarto o más episodio de tratamiento en su vida	
Número de mujeres que sólo recibieron tratamiento quirúrgico	
Número de mujeres que sólo recibieron tratamiento médico	
Número de mujeres que recibieron tratamiento quirúrgico y médico	

7.14 Cobertura de la dispensación multimensual de medicamentos antirretrovirales

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Registros o bases de datos de pacientes de terapia antirretroviral

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Si el país puede informar del periodo de dispensación desglosado en 3 intervalos mensuales

Personas actualmente inscritas y que reciben < 3 meses de terapia antirretroviral

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que reciben menos de 3 meses de dispensación de medicamentos antirretrovirales	54	50.4	54	54.9	51.9	62.5
Numerador : Número de personas que viven con el VIH y que recibieron < 3 meses de medicamentos antirretrovirales en su última visita al consultorio, o de otro entorno, antes de la fecha del análisis.	6885	70	6815	4727	2013	75
Denominador : Número de personas que viven con el VIH y que actualmente reciben terapia antirretroviral al final del periodo de notificación. Esto debe coincidir con los valores nacionales presentados a través de la herramienta de Monitoreo Global del SIDA.	12754	139	12615	8615	3880	120
Si este indicador sólo está disponible para una proporción de personas que reciben tratamiento, introduzca el número en el que se basa el porcentaje.	54	50.4	54	54.9	51.9	62.5

Personas actualmente inscritas y que reciben de 3 a < 6 meses de terapia antirretroviral

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que reciben 3 - <6 meses de dispensación multimensual de medicamentos antirretrovirales	45.6	48.2	45.5	44.7	47.6	37.5
Numerador : Número de personas que viven con el VIH y que recibieron 3 - < 6 meses de medicamentos antirretrovirales en su última visita clínica, o de otro entorno, antes de la fecha del análisis.	5811	67	5744	3853	1846	45
Denominador : Número de personas que viven con el VIH y que actualmente reciben terapia antirretroviral al final del periodo de notificación. Esto debe coincidir con los valores nacionales presentados a través de la herramienta de Monitoreo Global del SIDA.	12754	139	12615	8615	3880	120
Si este indicador sólo está disponible para una proporción de personas que reciben tratamiento, introduzca el número en el que se basa el porcentaje.	45.6	48.2	45.5	44.7	47.6	37.5

Personas actualmente inscritas y que reciben 6 meses o más de terapia antirretroviral

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH actualmente inscritas en la terapia antirretroviral que reciben 6 meses o más de dispensación de medicamentos antirretrovirales	0.5	1.4	0.4	0.4	0.5	0
Numerador : Número de personas que viven con el VIH y que recibieron 6 meses o más de medicamentos antirretrovirales en su última visita clínica, o de otro entorno, antes de la fecha del análisis.	58	2	56	35	21	0
Denominador : Número de personas que viven con el VIH y que actualmente reciben terapia antirretroviral al final del periodo de notificación. Esto debe coincidir con los valores nacionales presentados a través de la herramienta de Monitoreo Global del SIDA.	12754	139	12615	8615	3880	120
Si este indicador sólo está disponible para una proporción de personas que reciben tratamiento, introduzca el número en el que se basa el porcentaje.	0.5	1.4	0.4	0.4	0.5	0

Si el país no puede comunicar el período de dispensación desglosado en intervalos de 3 meses.

Personas actualmente registradas y que reciben 3 meses o más de terapia antirretrovírica.

	Todos	Todos < 15 años	Todos (15+)	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Transgénero (15+)
Percentage (%)	46	49.6	46	45.1	48.1	37.5
Numerador	5869	69	5800	3888	1867	45
Denominador	12754	139	12615	8615	3880	120
	46	49.6	46	45.1	48.1	37.5

7.15 Cobertura de los modelos de prestación de servicios diferenciados de terapia antirretroviral entre las personas que viven con el VIH actualmente en terapia antirretroviral

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Personas que viven con el VIH en modelos diferenciados de prestación de servicios de terapia antirretrovírica

	Todos	Hombres (15+)	Mujeres (15+)	Otro género (15+)	Niños (<15)
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas inscritas en modelos de TAR de DSD entre todas las personas que viven con el VIH en TAR al final del periodo que se reporta					
Numerador : Número de personas que viven con el VIH inscritas en modelos DSD ART durante el periodo que se reporta					
Denominador A : Número de personas que viven con el VIH en TAR durante el periodo que abarca el informe					
Denominador B : Número de personas que viven con el VIH en TAR elegibles para los modelos de TAR DSD durante el periodo que se reporta					

7.16 Supresión viral entre personas que viven con el VIH en modelos de terapia antirretroviral con prestación de servicios diferenciada

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): No

Herramienta/fuente de medición::

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha:

Hasta la fecha:

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Adultos (15+)

	Todos los adultos (15+) con TAR sin DSD	Todos los adultos (15+) con TAR no DSD	Todos los adultos (15+) Total en TAR	Hombres (15+) con TAR DSD	Hombres (15+) con TAR no DSD	Hombres (15+) Total con TAR	Mujeres (15+) con TAR sin DSD	Mujeres (15+) con TAR sin DSD	Total de mujeres (15+) en TAR	Otro sexo (15+) con TAR DSD	Otro sexo (15+) en TAR sin DSD	Otro sexo (15+) Total en TAR
Porcentaje (%) : Porcentaje de personas que viven con el VIH inscritas en modelos DSD ART que tienen supresión virológica durante el periodo que se reporta.												
Numerador : Número de personas que viven con el VIH inscritas en modelos DSD ART con al menos un resultado de la prueba rutinaria de carga viral que tienen supresión virológica (<1000 copias/mL)												
Denominador : Número de personas que viven con el VIH inscritas en un modelo DSD ART con al menos un resultado de carga vírica al final del periodo que se reporta												

Niños (<15)

	Con TAR DSD	Con TAR sin DSD	Total con TAR
Percentage (%) : Porcentaje de niños que viven con el VIH inscritos en modelos DSD ART que tienen supresión virológica durante el periodo que se reporta.			
Numerador : Número de niños que viven con el VIH inscritos en modelos DSD ART con al menos un resultado de la prueba rutinaria de carga vírica que tienen supresión virológica (<1000 copias/mL) durante el periodo que se reporta.			
Denominador : Número de niños que viven con el VIH inscritos en un modelo DSD ART con al menos un resultado de carga vírica al final del periodo que se reporta			

III Instrumento de Compromisos y Políticas Nacionales

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición: ICPN

Otra herramienta/fuente de medición:

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas:

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos:

Describe el proceso utilizado para recopilar y validar los datos del ICPN:

ICPN - PARTE A [para que respondan los funcionarios gubernamentales]

Nombres	Correo electrónico	Organización	Cargo	Tipo de parte interesada	Comentarios
Dra. Elena Candiari	direccion.pronasida@mspbs.gov.py	PRONASIDA	Directora	Ministerio de Salud	
Lic. José Blanco	administracion.pronasida@mspbs.gov.py	PRONASIDA	Administrador	Ministerio de Salud	
Dra. Giulia Cipolla	estrategica.pronasida@mspbs.gov.py	PRONASIDA	Jefa de Vigilancia Epidemiológica	Ministerio de Salud	
Dra. Alma Barboza	monitoreo.pronasida@mspbs.gov.py	PRONASIDA	Jefa de Monitoreo & Evaluación	Ministerio de Salud	
Dra. Estela Sanabria	atencionintegral.pronasida@pronasida.gov.py	PRONASIDA	Jefa de Atención Integral	Ministerio de Salud	
Lic. Carmen Martínez	consejeria.pronasida@mspbs.gov.py	PRONASIDA	Jefa de Consejería	Ministerio de Salud	
Dra. María Vera	laboratorio.pronasida@mspbs.gov.py	PRONASIDA	Jefa de Laboratorio	Ministerio de Salud	

NCPI - PARTE B [a rellenar por los representantes de la comunidad y de la sociedad civil y otros socios no gubernamentales].

Name	Correo electrónico	Organización	Cargo	Tipo de parte interesada	Comentarios
Adriana Irún	redongsida@gmail.com	Red de Ongs	Representante	Sociedad civil	
Paloma Martín Vera	paloma@somosgay.org	Somosgay	Directora	Sociedad civil	

A.1 Prevención combinada del VIH para todos

Prevención del VIH entre profesionales del sexo

1. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional que incluya acciones para reducir las nuevas infecciones entre los profesionales del sexo y proporcionar servicios a los mismos y a sus clientes?: Sí

1.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan): Empoderamiento y capacitación comunitarios para las organizaciones de profesionales del sexo, Alcance y servicios comunitarios para profesionales del sexo y sus clientes, Distribución de preservativos para profesionales del sexo y sus clientes, Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), Asesoramiento psicológico y/o servicios de salud mental, Servicios de prevención, pruebas y tratamiento de la hepatitis para los trabajadores del sexo y sus clientes, Acciones para hacer frente a la violencia, incluida la primera ayuda psicológica, Profilaxis posterior a la exposición (PEP), Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación

2. ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para los y las profesionales del sexo?: No, sólo hay procedimientos normalizados de trabajo para las organizaciones en el marco de programas específicos

3. ¿Ha establecido su país metas nacionales sobre prevención del VIH para el año 2025?: No

3.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las metas nacionales de prevención entre profesionales del sexo y sus clientes para el año 2025?:

3.1.a Número anual de nuevas infecciones por VIH entre profesionales del sexo y sus clientes:

3.1.b Porcentaje de profesionales del sexo atendidos por servicios de prevención del VIH:

3.1.c Porcentaje de clientes de profesionales del sexo que reciben servicios de prevención del VIH:

Prevención del VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

4. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional que incluya acciones para reducir las nuevas infecciones entre los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y para proporcionarles servicios?: Sí

4.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan): Empoderamiento y capacitación comunitarios para organizaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Alcance y servicios comunitarios, Distribución de preservativos y lubricantes compatibles con preservativos, Servicios de prevención, pruebas y tratamiento de la hepatitis, Servicios clínicos, Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), Asesoramiento psicológico y/o servicios de salud mental, Acciones para hacer frente a la violencia, incluida la primera ayuda psicológica, Profilaxis posterior a la exposición (PEP), Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación

5 ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres?: No, sólo hay procedimientos normalizados de trabajo para las organizaciones en el marco de programas específicos

6. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2025?: No

6.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para el año 2025?:

6.1.a Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres:

6.1.b Porcentaje de hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres atendidos por programas de prevención:

Prevención del VIH para personas transgénero

7. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional que incluya acciones para reducir las nuevas infecciones entre las personas transgénero y proporcionarles servicios?: Sí

7.1 En caso afirmativo, ¿la estrategia nacional incluye a las personas transgénero? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Empoderamiento de la comunidad y creación de capacidad para las organizaciones de personas transgénero, Alcance y servicios comunitarios, Distribución de preservativos y lubricantes compatibles con preservativos, Servicios de prevención, pruebas y tratamiento de la hepatitis, Servicios clínicos, Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), Asesoramiento psicológico y/o servicios de salud mental, Acciones para hacer frente a la violencia, incluida la primera ayuda psicológica, Profilaxis posterior a la exposición (PEP), Actuaciones para reducir el estigma y la discriminación

8. ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para personas transgénero?: No, sólo hay procedimientos normalizados de trabajo para las organizaciones en el marco de programas específicos

9. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para 2025 para las personas transgénero?: No

9.1 En caso afirmativo, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para 2025 para las personas transgénero?:

9.1.a Número anual de nuevas infecciones por VIH entre las personas transgénero::

9.1.b Porcentaje de personas transgénero a las que llegan los programas de prevención::

Prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas

10. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional que incluya acciones para reducir las nuevas infecciones entre las personas que se inyectan drogas y proporcionarles servicios?: Sí

10.1 En caso afirmativo, ¿la estrategia nacional incluye a las personas que se inyectan drogas? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Alcance y servicios basados en la comunidad, Distribución de preservativos y lubricantes compatibles con el preservativo, Servicios de prevención, pruebas y tratamiento de la hepatitis, Servicios clínicos, Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS), Asesoramiento psicosocial y/o servicios de salud mental, Acciones para hacer frente a la violencia, incluidos los primeros auxilios psicológicos, Profilaxis posterior a la exposición (PEP), Acciones para reducir el estigma y la discriminación

11. ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para personas que se inyectan drogas?: No, sólo hay procedimientos normalizados de trabajo para las organizaciones en el marco de programas específicos

12. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para 2025 para las personas que se inyectan drogas?: No

12.1 En caso afirmativo, ¿cuáles son los objetivos nacionales de prevención para 2025 para las personas que se inyectan drogas?:

12.1.a Número anual de nuevas infecciones por VIH entre las personas que se inyectan drogas::

12.1.b Porcentaje de personas que se inyectan drogas a las que llegan los programas de prevención::

13. ¿Existen políticas nacionales que excluyen a los consumidores de droga a la hora de recibir terapia antirretroviral?: No

14. ¿Hay en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas operativos?: No, pero pueden adquirirse agujas y jeringuillas legalmente en farmacias, sin necesidad de prescripción médica

15. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas o jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?: No

16. ¿Existen programas de terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos operativos en su país?: No

17. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?: No

Servicios de prevención del VIH para la población reclusa y otras personas privadas de libertad

18. ¿Dispone su país de una estrategia nacional que incluya acciones para reducir las nuevas infecciones entre la población reclusa y otras personas privadas de libertad y prestarles servicios?: Sí

18.1 En caso afirmativo, ¿incluye la estrategia nacional a las personas que se encuentran en las prisiones y otras personas privadas de libertad? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Servicios comunitarios de proximidad, Servicios de prevención, pruebas y tratamiento de la hepatitis, Servicios clínicos, Servicios de prevención, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS)

19. ¿Existen procedimientos operativos estándar nacionales o directrices nacionales de implementación detalladas para las organizaciones que implementan programas de prevención del VIH para la población reclusa y otras personas privadas de libertad?: No, sólo hay procedimientos normalizados de trabajo para las organizaciones en el marco de programas específicos

20. ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para 2025 para la población reclusa y otras personas privadas de libertad?: No

20.1 ¿Ha establecido su país objetivos nacionales de prevención para 2025 para la población reclusa y otras personas privadas de libertad?:

20.1.a Número anual de nuevas infecciones por VIH entre la población reclusa y otras personas privadas de libertad::

20.1.b Porcentaje de población reclusa y otras personas privadas de libertad a las que llegan los programas de prevención::

21. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las prisiones?: No

21.1 En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje de prisiones?:

22. ¿Existen programas de terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos operativos en las prisiones y otros centros cerrados de su país?: No

22.1 En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje de prisiones y otros entornos cerrados?:

23. ¿Las personas en prisión de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes?: Sí

23.1 En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje de prisiones y otros entornos cerrados?: En pocos (<50 %) centros

24. ¿Se realizan en su país pruebas sobre VIH en las prisiones?:

24.a ¿Se llevan a cabo solo con el consentimiento informado de las personas en prisión?: Sí

24.b ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida?: No

24.c ¿Son gratuitas?: Sí

24.d ¿Son confidenciales?: Sí

24.e ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?: Sí

24.f ¿Se acompañan de información relevante y accesible?: Sí

24.g ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de la prueba?: Sí

24.h ¿Igualmente accesible para todas las personas en prisiones y otros entornos cerrados?: Sí

24.h.i Si la respuesta es negativa, ¿qué personas en prisión no disfrutan de ese acceso igualitario?:

25. ¿Es accesible la terapia antirretroviral a todas las personas que viven con el VIH en prisiones y otros entornos cerrados en su país?: Sí

25.1 En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje de prisiones y otros entornos cerrados?: En muchos (entre el 50 y el 95 %) centros

26. ¿Está disponible el tratamiento de la hepatitis C (con medicamentos antivirales de acción directa) en las prisiones y otros entornos cerrados de su país?: Sí

26.1 En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje de prisiones y otros centros de régimen cerrado?: En todo el país (>95 % centros)

27. ¿Existen programas posteriores a la puesta en libertad que garanticen la continuidad de los cuidados para:

27.a ¿Terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos?: No

27.b Terapia antirretroviral?: Sí

Prevención del VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH

28. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional que incluya actuaciones para reducir las nuevas infecciones de VIH entre chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH?:

28.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

29. ¿Ha establecido su país metas nacionales sobre prevención del VIH para chicas adolescentes, mujeres jóvenes y sus parejas masculinas en comunidades con alta incidencia de VIH?: Sí

29.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las metas nacionales de prevención para chicas adolescentes y mujeres jóvenes y sus parejas masculinas para el año 2025?:

29.1.a Número anual de nuevas infecciones por el VIH entre chicas adolescentes y mujeres jóvenes de 15 a 29 años (especifique el número):: 155

29.1.b Porcentaje de mujeres jóvenes (de 15 a 29 años) en comunidades de alta incidencia a las que llegan los servicios de prevención del VIH:: 37

29.1.c Porcentaje de parejas masculinas (de 20 a 34 años) de niñas y mujeres jóvenes en comunidades de alta incidencia a las que llegan los servicios de prevención del VIH::

Profilaxis previa a la exposición (PrEP)

30. ¿Recomiendan las directrices nacionales de su país alguna de las siguientes modalidades/productos de profilaxis previa a la exposición (PrEP)? Seleccione todas las opciones que correspondan.: PrEP oral diaria,PrEP basada en eventos (a demanda)

30.1 ¿A qué poblaciones se suministra la profilaxis previa a la exposición (PrEP) según las directrices nacionales? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Hombres gais y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres,Profesionales del sexo,Personas que usan drogas inyectables,Personas transgénero,Parejas serodiscordantes,Mujeres jóvenes (de 18 a 24 años),Adolescentes (<17 años),Personas en prisiones y otros entornos cerrados,Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia,Personas con PrEP solicitada

Si la respuesta es "Otro", especifique:

30.2 ¿Quién tiene la autoridad para prescribir la profilaxis previa a la exposición (PrEP) en su país? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Médicos

Si la respuesta es "Otro", especifique:

30.3 ¿Está disponible la profilaxis previa a la exposición (PrEP) a través de alguno de los siguientes medios en su país? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Centros públicos de salud,Distribución comunitaria (incluidos los servicios móviles),Centros de investigación

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Preservativos

34. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan en relación con el preservativo?: Sí

34.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una estrategia o plan nacional sobre el preservativo que expresamente aborde las necesidades de las siguientes poblaciones y programas de preservativos dirigidos a ellas? (seleccione todas las opciones que correspondan): Personas que viven con el VIH,Profesionales del sexo (hombres y mujeres),Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres,Personas que se inyectan drogas,Jóvenes (de 15 a 24 años de edad),Presos y otras personas privadas de libertad,El público general

34.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿esa estrategia nacional sobre el preservativo incluye...? (seleccione todas las opciones que correspondan):: Distribución gratuita entre grupos de población clave,Ventas del sector privado,Promoción del preservativo a través de los medios de comunicación,Promoción del preservativo en las escuelas (secundarias)

35. ¿Se han estimado las necesidades nacionales en cuanto a preservativos?: Sí

35.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el número estimado de preservativos necesarios?: 2413454

35.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué año es la estimación de las necesidades del preservativo?: 2024

35.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué método se utilizó para estimar el número estimado de preservativos necesarios?: Histórico (igual que el año anterior + crecimiento de la población)

Si la respuesta es "Otro", especifique:

36. ¿Se utiliza en su país la posesión de preservativos como prueba suficiente para la detención o para apoyar el enjuiciamiento de un delito?: No

37. ¿Existen en su país restricciones de edad para el acceso a preservativos?: No

38. ¿Existen en su país restricciones sobre la distribución de preservativos en lugares públicos?: No

Si la respuesta es afirmativa, especifique::

39. ¿Existe una política o directriz para la promoción y distribución de preservativos iniciada por proveedores (por ejemplo, para un proveedor de atención sanitaria que ofrece asesoramiento y suministro de preservativos de manera activa)?: Sí, para todas las personas en edad reproductiva que visitan un centro de salud, Sí, para todas las poblaciones clave y otras personas con riesgo más alto de infección con VIH, Sí, para todas las personas jóvenes que estén sexualmente activas, Sí, para todas las personas que acceden a servicios de pruebas de VIH, Sí, para todas las personas que acceden a métodos hormonales u otros métodos anticonceptivos, Sí, para todas las parejas serodiscordantes

40. ¿Ha habido situaciones de desabastecimiento* de preservativos en los últimos 12 meses?

40.a Situaciones de desabastecimiento de alcance nacional: Sí

40.b Situaciones de desabastecimiento de alcance local: Sí

Servicios para personas afectadas por emergencias humanitarias

41. ¿Son accesibles en su país los siguientes servicios para las personas afectadas por emergencias humanitarias? Incluye a todas las personas afectadas por emergencias, incluyendo, sin limitación, personas no desplazadas, refugiados y solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes.

41.a Asesoramiento y pruebas sobre el VIH: Sí

41.b Prevención de la transmisión vertical del VIH: Sí

41.c Tratamiento del VIH: Sí

41.d Detección y tratamiento de la tuberculosis (TB): Sí

41.e Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual: Sí

41.f Servicios para grupos de población clave: Sí

41.g Servicios para supervivientes de violencia sexual o de violencia de género: Sí

41.h Asistencia alimentaria y nutricional: No

Refugiados y solicitantes de asilo

42. ¿Permiten las leyes/políticas nacionales que los refugiados y los solicitantes de asilo accedan a los servicios del VIH (pruebas, medicamentos antirretrovirales y atención) en las mismas condiciones que los ciudadanos?

42.a Refugiados: Sí

42.a.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política?: Sí

42.b Solicitantes de asilo: Sí

42.b.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política?: Sí

Las poblaciones migratorias (los migrantes se definen como no ciudadanos que se encuentran en un país diferente a su país de origen en el que se van a quedar más de seis meses)

43. ¿Las leyes/políticas nacionales permiten a los migrantes acceder a servicios de VIH (pruebas, medicamentos antirretrovirales y atención) bajo las mismas condiciones que a los ciudadanos?

43.a. Migrantes documentados: Sí

43.a.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política?: Sí

43.b Migrantes indocumentados: Sí

43.b.i Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la política?: Sí

Educación sexual integral

44. ¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad*, de acuerdo con estándares internacionales*, en...?:

a) La escuela primaria: No

b) La escuela secundaria: Sí

c) La formación para profesores: No

45. ¿Los representantes del Ministerio de Educación están incluidos en el mecanismo nacional de coordinación del VIH o equivalente?: Existe un mecanismo de coordinación nacional del VIH o equivalente, e incluye a representantes del Ministerio de Educación

46. ¿Su país ha establecido un objetivo nacional sobre conocimiento integral del VIH entre adolescentes y jóvenes?: Sí

46.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un mecanismo nacional para supervisar y revisar el progreso hacia el objetivo?: No

47. ¿La educación sobre el VIH y la sexualidad basada en las habilidades para la vida* forma parte del plan de estudios nacional o equivalente, en:

a) La escuela primaria: No

b) La escuela secundaria: No

c) La formación para profesores: No

48. ¿Incluye el sistema nacional de información sobre la gestión de la educación (EMIS) u otra herramienta de seguimiento del sector educativo preguntas sobre la provisión de los siguientes componentes de la educación sobre el VIH y la sexualidad basada en la preparación para la vida activa*?

	Preguntas en EMIS o equivalente	Datos recogidos
habilidades genéricas para la vida (como la toma de decisiones, la comunicación y la capacidad de negociación)		
salud sexual y reproductiva y educación sexual (como el crecimiento y el desarrollo humano, las relaciones, la salud reproductiva, el abuso sexual y la transmisión de infecciones de transmisión sexual)		
Transmisión y prevención del VIH		

A.2 Cumplimiento del objetivo 95-95-95 para pruebas de detección del VIH y el tratamiento del VIH

Pruebas sobre VIH

49. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enfoques en cuanto a pruebas sobre VIH se utilizan en su país (seleccione todas las opciones que correspondan)?: Pruebas y asesoramiento iniciados por el cliente, Pruebas y asesoramiento iniciados por el proveedor, Pruebas prenatales rutinarias, Pruebas dobles de diagnóstico rápido de VIH/sífilis para mujeres embarazadas en la atención prenatal, Pruebas duales de VIH/sífilis en atención prenatal, Pruebas basadas en la comunidad, Pruebas a través de proveedores no profesionales

Si la respuesta es "Otro", especifique:

50. ¿Ha adaptado su país las recomendaciones de las Directrices Consolidadas sobre los servicios de pruebas sobre VIH de la OMS 2019 en un procedimiento nacional sobre directrices para este tipo de pruebas?: Sí, plenamente

51. ¿Ha adoptado o incluido su país pruebas de autodiagnóstico sobre VIH como política o plan nacional?: Sí

51.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿están implementadas de forma rutinaria las pruebas de autodiagnóstico del VIH en su país?: No, solo proyectos piloto

51.1 Si la respuesta es negativa, ¿está en desarrollo una política o plan nacional con respecto a las pruebas de autodiagnóstico del VIH?:

51.2a Si la respuesta a la Pregunta 51.2 es afirmativa, indíquese el año en que está planificado que se incluyan las pruebas de autodiagnóstico::

51.3 Si la respuesta a la pregunta 51 es afirmativa, ¿ha incluido su país el autoanálisis del VIH para apoyar el inicio o la continuación de la PrEP (ya sea dentro de la política o el plan nacional de pruebas del VIH o como política independiente de autoanálisis del VIH)?:

51.3a Si la respuesta a la pregunta 51.3 es afirmativa, ¿se realiza de forma rutinaria en su país el autoanálisis del VIH para apoyar la PrEP?:

51.4 Si la respuesta a la pregunta 51 es afirmativa, ¿ha incluido su país el autodiagnóstico del VIH en los centros (ya sea dentro de la política o plan nacional de pruebas del VIH o como política independiente de autodiagnóstico del VIH)?: Sí

51.4a Si la respuesta a la pregunta 51.4 es afirmativa, ¿se practica habitualmente en su país el autoanálisis del VIH en los centros?: No, solo proyectos piloto

52. ¿Ha incluido su país los servicios a la pareja (derivación asistida por el proveedor, notificación asistida a la pareja, pruebas del índice) como política nacional?: Sí

52.1 En caso afirmativo, ¿qué enfoques de servicios asociados se están utilizando (seleccione todas las opciones que correspondan)?: Enhanced partner referral (client receives some help from a provider to refer their partners for testing)

53. ¿Su país ha incluido enfoques de servicios de pruebas de VIH a través de las redes sociales en su política nacional?: No

53.1 En caso afirmativo a la pregunta 53, identifique los enfoques de redes sociales disponibles en su país (seleccione todas las opciones que correspondan):

53.1a Si la respuesta a la pregunta 53 es afirmativa, ¿en qué poblaciones se están utilizando enfoques de pruebas basados en redes sociales (seleccione todas las que procedan)?:

54. ¿Ha adoptado o incluido su país las pruebas duales de diagnóstico rápido del VIH/sífilis para mujeres embarazadas y/o poblaciones clave como política o plan nacional?: Sí, tanto para mujeres embarazadas como para poblaciones clave

54.1 En caso afirmativo, ¿se aplican sistemáticamente en su país las pruebas duales de diagnóstico rápido del VIH/sífilis?:

54.1a Para las mujeres embarazadas:: Sí, implementadas de forma rutinaria a escala nacional

54.1b Para personas de poblaciones clave:: Yes, routinely implemented on a national scale, including subnational

55. ¿Su país utiliza tres pruebas reactivas consecutivas (estrategia/algoritmo de 3 pruebas) para el diagnóstico de VIH positivo?: No

55.1 En caso negativo, ¿tiene su país un plan para adoptar una estrategia/algoritmo de 3 pruebas para el diagnóstico del VIH?: No

55.2 En caso afirmativo, indique el año en el que se prevé adoptar una política nacional sobre la estrategia de las tres pruebas para el diagnóstico del VIH.:

55.3 ¿Utiliza su país las siguientes pruebas en la estrategia/algoritmo nacional estándar/de rutina?: Rapid diagnostic test ,Immunoassay ,Western blotting ,Nucleic acid test

55.4 ¿Dispone su país de una política de repetición sistemática de las pruebas antes de iniciar la terapia antirretroviral?:

56. ¿Cuenta su país con una política que establezca que las pruebas de VIH se facilitarán?: De forma gratuita para todos

57. ¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH?:

:

57.a Son obligatorias antes del matrimonio: No

57.b Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o residencia: No

**57.c ¿Es obligatorio para determinados grupos o profesiones (sin incluir a los donantes de sangre y/o tejidos)?:
No**

57.c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifíquense esos grupos::

58. Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH e inclusión en servicios de atención sanitaria tras un diagnóstico de VIH-positivo?: Sí

**58.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:
Intervenciones racionalizadas (vinculación potenciada, revelación, rastreamiento),Enfoques basados en apoyo de pares y navegación para pacientes,Intervenciones psicosociales, incluyendo apoyo entre pares y redes sociales para adolescentes que viven con el VIH, Uso de pruebas de CD4 como herramienta de detección para vincular con un paquete de atención avanzado sobre la enfermedad por VIH, Servicios de pruebas sobre VIH y terapia antirretroviral situados en el mismo lugar y basados en instalaciones, Actividades colaborativas TB/VIH no situadas en el mismo lugar**

Si la respuesta es "Otras opciones", especificar:

59. ¿Cuenta su país con políticas y/o estrategias nacionales sobre la vinculación de pruebas y asesoramiento sobre VIH tras un diagnóstico de VIH-negativo?: Sí, pero solo para poblaciones clave y grupos de alto riesgo

**59.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿incluyen lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?:
Intervenciones racionalizadas (vinculación potenciada o revelación), Enfoques basados en apoyo de pares y navegación para pacientes, Servicios de PrEP y pruebas sobre VIH situados en el mismo lugar y basados en instalaciones**

Si la respuesta es "Otras opciones", especificar:

Terapia antirretroviral

60. ¿Ha adoptado su país las recomendaciones sobre el inicio rápido de la terapia antirretroviral de las Directrices consolidadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021 sobre prevención, pruebas, tratamiento, prestación de servicios y seguimiento del VIH: recomendaciones para un enfoque de salud pública?: Sí, se realiza un inicio rápido dentro de los 7 días del diagnóstico con VIH

Si la respuesta es "Otro", especifique:

60.1 Si su país ha adoptado una política de inicio rápido de la terapia antirretroviral, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

Si la respuesta es "Otro", especifique:

61. ¿Dispone su país de una política para ofrecer el inicio de la terapia antirretroviral el mismo día del diagnóstico del VIH, como parte de la política de inicio rápido de la terapia antirretroviral?: Sí

61.1 En caso afirmativo, ¿cuál es el estado de aplicación?: Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

Si la respuesta es "Otro", especifique:

62. ¿Se dispone de pruebas de CD4 para diagnosticar la enfermedad por VIH avanzada?: Sí

62.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde está disponible?: Centro de atención sanitaria

Si la respuesta es "Otro", especifique (Seleccione todas las opciones que correspondan):

62.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué porcentaje de centros (estimado) tienen acceso a los clientes a las pruebas y los resultados?: En muchos (entre el 50 y el 95 %) centros

Si la respuesta es "Otro", especifique:

62.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el tiempo promedio para que el paciente reciba los resultados de las pruebas CD4? : Especifique:

Especifique: 48 horas

63. ¿Está permitido en su país el inicio de la terapia antirretroviral por personal de enfermería para alguno de los siguientes grupos de población? (seleccione todas las opciones que correspondan): Mujeres embarazadas

64. ¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antirretroviral (externo a las instalaciones de salud)? : No

64.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿la entrega comunitaria está implementada...:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

64.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué poblaciones se proporciona la terapia antirretroviral en entornos comunitarios (como fuera de las instalaciones de salud) en su país?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

64.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué servicios de atención diferenciados utiliza su país para la recogida de medicamentos antirretrovirales (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

65. ¿Tiene su país una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para los adultos que están establecidos* en la terapia antirretroviral?: Sí

65.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional:: Cada 3 meses

65.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación:: Implementado en muchos (del 50 % al 95 %) de los centros de tratamiento

Si la respuesta es "Otro", especifique:

66. ¿Tiene su país una política nacional sobre la frecuencia con la que los adultos que están establecidos* en la terapia antirretroviral deben recoger los medicamentos antirretrovirales?: Sí

66.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de la retirada de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional:: Cada 3 meses

Si la respuesta es "Otro", especifique:

66.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación:: Implementado en muchos (del 50 % al 95 %) de los centros de tratamiento

Si la respuesta es "Otro", especifique:

67. ¿Incluyen los criterios nacionales del país para (o la definición de) las personas establecidas* en terapia antirretroviral los siguientes elementos definidos en las Directrices consolidadas de 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre prevención, pruebas, tratamiento, prestación de servicios y seguimiento del VIH: recomendaciones para un enfoque de salud pública (seleccione todas las que correspondan)?: Receiving antiretroviral therapy for at least 6 months, Good understanding of lifelong adherence, Evidence of treatment success (i.e., at least one suppressed viral load result within the past 6 months)

Si la respuesta es "Otro", especifique:

68. ¿Proporciona el país apoyo psicológico a los adolescentes que viven con el VIH?: Sí

69. ¿Su país emplea intervenciones para rastrear a las personas que se han desvinculado de la asistencia y proporcionarles apoyo para que vuelvan a participar?: Sí

70. Facilite los criterios nacionales para (o la definición de) la pérdida de seguimiento. A título orientativo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define "perdido durante el seguimiento" como un paciente que no ha recibido medicamentos antirretrovirales en los 28 días siguientes a su última cita de recogida de medicamentos.: Se considera como Abandono del tratamiento a aquellas PVV que no registran retiro de ARV en la Farmacia en los últimos 90 días de su último retiro.

71. ¿Ha adoptado su país las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021 sobre prevención, pruebas, tratamiento, prestación de servicios y seguimiento del VIH: recomendaciones para un enfoque de salud pública que ofrezca un paquete de intervenciones a todos los pacientes que presenten una enfermedad por VIH avanzada (definida por la OMS como CD4<200)?: Sí, la ha adoptado plenamente

Especifique:

71.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en muchos (del 50 % al 95 %) de los centros de tratamiento

Si la respuesta es "Otro", especifique:

72. ¿Cuáles de los siguientes componentes del paquete de intervenciones avanzadas contra la enfermedad del VIH para la tuberculosis (TB), las infecciones bacterianas graves y la meningitis criptocócica recomendadas en las Directrices consolidadas de la OMS de 2021 sobre la prevención, las pruebas, el tratamiento, la prestación de servicios y el seguimiento del VIH: recomendaciones para un enfoque de salud pública están incluidos en la política nacional sobre la terapia antirretrovírica para adultos, adolescentes y niños? Por favor, seleccione todo lo que corresponda.: Baseline CD4 test to diagnose advanced HIV disease, Molecular diagnostic tests TB diagnosis, Profilaxis con cotrimoxazol, Tratamiento preventivo de TB, Inicio rápido de terapia antirretroviral, Soporte de adhesión adaptado

Si la respuesta es "Otro", especifique:

73. ¿Cuál o cuáles de las siguientes modalidades de provisión de servicios se incluyen en la política nacional sobre terapia antirretroviral para adultos, adolescentes y niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?:: Los proveedores de terapia antirretroviral ofrecen tratamiento para TB en entornos de terapia antirretroviral a lo largo de la duración del tratamiento de TB, Los proveedores de servicios para madres, recién nacidos y niños ofrecen terapia antirretroviral en centros sanitarios de atención para madres, recién nacidos y niños, Los proveedores de terapia antirretroviral proporcionan terapia antirretroviral para mujeres embarazadas, Los proveedores de terapia antirretroviral proporcionan terapia antirretroviral para recién nacidos, bebés y niños, Servicios de asesoramiento y apoyo nutricional ofrecidos para personas que viven con el VIH y que presentan cuadros de malnutrición, Estrategias de apoyo psicosocial para una atención centrada en el paciente (p. ej.: grupos de apoyo, asesoramiento sobre adherencia mejorado, apoyo para la revelación o remisión a servicios psicológicos/socioeconómicos) vinculadas a las instalaciones, Servicios de salud para adolescentes, Los proveedores de terapia antirretroviral llevan a cabo pruebas de detección y tratamiento de

enfermedades cardiovasculares, Los proveedores de terapia antirretroviral llevan a cabo pruebas de detección y tratamiento sobre salud mental

Si la respuesta es "Otro", especifique:

74. ¿Pagan los pacientes tasas o cargos por servicios de forma rutinaria cuando visitan un centro de salud público?: No

74.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe una tasa formal específica o una tasa informal/variable para lo siguiente?:

74.1.a Pruebas sobre VIH:

74.1.b Dispensado de PrEP:

74.1.c Cita de atención primaria:

74.1.d Tarjetas de paciente:

74.1.e Servicios de diagnóstico (incluida la prueba de carga viral):

74.1.f Dispensado de tratamiento para el VIH (es decir, medicamentos antirretrovirales):

74.1.g Dispensación de prevención y tratamiento de coinfecciones:

74.1.h Dispensación de otras coterapias (por ejemplo, medicamentos para enfermedades no transmisibles, salud sexual y reproductiva, vacunas):

Regímenes de terapia antirretroviral

Adultos y adolescentes

75. En base a las recomendaciones de las Directrices consolidadas de la OMS de 2021 sobre prevención, pruebas, tratamiento, prestación de servicios y seguimiento del VIH: recomendaciones para un enfoque de salud pública, ¿es el TDF + 3TC (o FTC) + DTG la combinación antirretroviral de primera línea preferida para el inicio del tratamiento en las directrices nacionales para lo siguiente

:

75.a Adultos y adolescentes: Sí

75.a.i. En caso afirmativo, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en muchos (del 50 % al 95 %) de los centros de tratamiento

Si la respuesta es "Otro", especifique:

75.a.ii. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

75.a.iii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC (o FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2022?:

75.b Mujeres en edad de procrear: Sí

75.b.i. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

75.b.ii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2022?:

75.c Mujeres embarazadas y/o lactantes: Sí

75.c.i. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción u opciones de preferencia?:

Si la respuesta es "Otros regímenes", especifique:

75.c.ii. Si la respuesta es negativa, ¿hay un plan para adoptar TDF + 3TC o (FTC) + DTG como la combinación de antirretrovirales de primera línea de preferencia para la iniciación de tratamiento en 2022?:

76. ¿Utiliza su país combinaciones de terapia antirretroviral de dosis fija (FDC) como terapia de primera línea preferida (seleccione todas las que sean aplicables)?: Sí, combinación de dosis fija de 3 medicamentos suministrados una vez al día

Si la respuesta es "Otro", especifique:

77. ¿En las directrices nacionales se incluye un régimen basado en DTG como opción para la combinación antirretroviral de segunda línea para adultos y adolescentes con VIH?: Yes, as preferred option

Si la respuesta es "Otro", especifique:

78. ¿Está incluido en las directrices nacionales un régimen basado en ATV/r (o en LPV/r) como opción para la combinación antirretroviral de segunda línea para adultos y adolescentes con VIH?: Yes, as alternative option

Si la respuesta es "Otro", especifique:

79. ¿Está incluido en las directrices nacionales un régimen basado en darunavir/ritonavir como opción para la terapia antirretroviral de adultos y adolescentes con VIH?: No

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Niños

80. ¿Son los regímenes de DTG la opción preferida de inicio de tratamiento en las directrices nacionales para todos los bebés y niños con VIH?: Sí, para todos los niños mayores de 4 semanas y que pesen más de 3 kg

Si la respuesta es "Otro", especifique:

80.1 Si DTG no es la opción de tratamiento preferida para los lactantes y niños mayores de 4 semanas y que pesen más de 3 kg, ¿son los regímenes basados en LPV/r la opción de tratamiento preferida?:

81. ¿Cuál es la estructura central de INNTI* recomendada para iniciar el tratamiento en niños en las directrices nacionales?: ABC + 3TC (o FTC)

Si la respuesta es "Otro", especifique:

82. ¿Se recomienda la DTG como opción preferida de segunda línea para los niños a los que les fallan los regímenes basados en NNRTI*?: Sí, para todos los niños mayores de 4 semanas

Si la respuesta es "Otro", especifique:

83. ¿Se recomienda la DTG como opción preferente de segunda línea para los niños a los que les fallan los regímenes basados en inhibidores de la proteasa?: Sí, para todos los niños mayores de 4 semanas y que pesen más de 3 kg

Si la respuesta es "Otro", especifique:

84. ¿Cuál es la opción de segunda línea recomendada para los niños a los que les fallan los regímenes basados en DTG?: LPV/r

Si la respuesta es "Otro", especifique:

85. ¿Está incluido en las directrices nacionales un régimen basado en darunavir/ritonavir (DRV/r) como opción para la terapia antirretroviral de niños con VIH?: Not recommended

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Las preguntas relacionadas con la carga viral se incluyen en la sección A.2.B.

86. ¿Se integra alguna de las siguientes actividades de desarrollo de la primera infancia en los programas de VIH? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Cuidados sensibles, Promover el aprendizaje temprano, Integrar las intervenciones de cuidado y nutrición, Apoyar la salud mental materna

Vigilancia de la resistencia a los medicamentos contra el VIH y toxicidad

87. ¿Cuenta su país con un plan nacional para monitorear la resistencia a medicamentos antirretrovirales?: No

87.1 Si la respuesta es afirmativa, por favor especifique los años que abarca el plan::

88. En los tres últimos años, ¿ha llevado a cabo su país una vigilancia de la resistencia a medicamentos contra el VIH (HIVDR) de acuerdo con los siguientes protocolos de la OMS?:

88.a Encuestas sobre resistencia a medicamentos de pretratamiento (PDR): No, pero existe un plan para implementar la encuesta de PDR este año

88.a.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta de PDR:	

88.b Encuesta sobre la farmacoresistencia del VIH entre personas expuestas a profilaxis preexposición (PrEP) diagnosticadas con VIH: No, pero existe un plan para implementar la encuesta este año

88.b.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

88.c Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos en adultos: No, pero existe un plan para implementar la encuesta este año

88.c.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

88.d Encuestas sobre resistencia adquirida a medicamentos entre población infantil: No, pero existe un plan para implementar la encuesta este año

88.d.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se inició la última encuesta:	

88.e Resistencia a medicamentos contra el VIH entre bebés (<18 meses) utilizando diagnóstico infantil temprano: No, pero existe un plan para implementar la encuesta sobre recién nacidos este año

88.e.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año se inició la última encuesta sobre recién nacidos:	

88.f Encuestas o monitoreo rutinarios de rendimiento clínico utilizando indicadores de alerta temprana sobre resistencia a medicamentos contra el VIH:

88.f.i. Si la respuesta es afirmativa, especifique:

	Valor de datos
Año en que se monitoreó por última vez:	
Cantidad de centros sanitarios monitoreados:	

88.f.ii. Los indicadores de alerta temprana sobre la resistencia a los medicamentos contra el VIH se recopilaron de las siguientes maneras::

89. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la resistencia a medicamentos contra el VIH para pacientes individuales que fracasan con el tratamiento antirretroviral de segunda línea?: No

89.1 En caso afirmativo, ¿cuáles de los siguientes grupos se tienen en cuenta en la política (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

90. ¿Dispone su país de una política nacional para la realización de pruebas de farmacoresistencia del VIH a pacientes individuales que inician una terapia antirretroviral?: No

90.1 En caso afirmativo, ¿cuáles de los siguientes grupos se tienen en cuenta en la política (seleccione todos los que procedan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

91. Excluyendo enfoques de farmacovigilancia pasiva, ¿realiza su país esfuerzos sistemáticos continuados para monitorear en el país la toxicidad de medicamentos antirretrovirales?: No

91.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan: (seleccione todas las opciones que correspondan)?::

92. ¿Se han introducido enfoques para la vigilancia de toxicidad para monitorear las reacciones adversas al uso de DTG?: No

92.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué enfoques se utilizan: (seleccione todas las opciones que correspondan)?::

92.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿se ha implementado la capacitación de trabajadores de atención sanitaria con respecto a la administración, la captura y el informe de reacciones adversas al uso de DTG?:

Adherencia y retención

93. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre apoyo a la adherencia?: Sí

94. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan): Asesores entre pares, Mensajes de texto, Reintegración de pacientes: llamadas de seguimiento/visitas en el hogar, Mejora del asesoramiento sobre adherencia, Remisión a apoyo psicológico/socioeconómico, Terapia cognitivo-conductual, Formación sobre capacidades conductuales/formación sobre adherencia a medicaciones, Combinaciones de dosis fija y regímenes de una sola aplicación diaria, Gestión de casos, Navegación entre pares

Si la respuesta es "Otro", especifique:

95. ¿Tiene su país políticas y/o estrategias nacionales sobre retención en terapia antirretroviral?: Sí

96. ¿Se están implementando alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan): Intervenciones de base comunitaria, Asociaciones de adherencia terapéutica y apoyo entre pares

Si la respuesta es "Otro", especifique:

97. ¿Hay disponibles en su país programas de alfabetización terapéutica para las personas que viven con el VIH, incluyendo información sobre efectos secundarios, resistencia a medicamentos, etc.?: Sí

Tuberculosis/VIH

98. ¿Se recomiendan las siguientes herramientas de detección para las personas que viven con el VIH en las directrices nacionales relacionadas con la tuberculosis (TB) y/o el VIH (seleccione todas las que procedan)?: World Health Organization-recommended, four- symptom screen for adults and adolescents (>10 years), C-reactive protein (CRP) for adults and adolescents (>10 years), Chest X-ray for adults and adolescents (>10 years), Molecular World Health Organization-approved rapid diagnostic tests for TB (mWRD) for adults and adolescents (>10 years), Symptom screen, including cough, fever, poor weight gain or close contact with a TB patient for children <10 years

99. ¿Ha adoptado su país la actualización de la política The use of lateral flow urine lipoarabinomannan assay (LF-LAM) for the diagnosis and screening of active tuberculosis in people living with HIV de la OMS de 2015?: No

100. ¿Cuál de los siguientes regímenes se recomienda en las directrices nacionales para el tratamiento preventivo de TB? (seleccione todas las opciones que correspondan)

:

100.a Adultos y adolescentes que viven con el VIH: 9 meses en monoterapia con isoniácida diaria (9H), 3 meses con rifapentina más isoniácida semanal (3HP), 1 mes con rifapentina más isoniácida diaria (1HP)

Si la respuesta es "Otro", especifique:

100.a.i Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia?: 9 meses en monoterapia con isoniacida diaria (9H)

Si la respuesta es "Otro", especifique:

100.b Niños que viven con el VIH: 6 meses en monoterapia con isoniacida diaria (6H)

Si la respuesta es "Otro", especifique:

100.b.i Si se recomienda más de un régimen, ¿cuál es el régimen de preferencia?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

101. ¿Se exige lo siguiente en las directrices nacionales antes de iniciar el tratamiento preventivo de la tuberculosis (TB) en personas con VIH?

:

101.a Pruebas cutáneas o ensayo de liberación de interferón-gamma (IGRA): No

101.b Rayos X: No

102. En el último periodo del que se informa, ¿ha habido situaciones de desabastecimiento de...?

:

102.a Isoniacida: No

102.b Vitamina B6: No

102.c Rifapentina (incluidas las combinaciones de dosis fijas con isoniazida): No

103. ¿Cuál es la situación de la integración de los siguientes servicios VIH/TB?

:

103.a Coimplantación del diagnóstico molecular rápido recomendado por la OMS (por ejemplo: Xpert MTB/RIF): En muchos (entre el 50 % y el 95 %) centros sanitarios que proporcionan servicios de pruebas y atención para el VIH

Si la respuesta es "Otro", especifique:

103.b Las personas que viven con el VIH y tienen TB reciben medicamentos antirretrovirales en el mismo centro en que reciben el tratamiento para TB: En muchos (entre el 50 % y el 95 %) centros sanitarios

Si la respuesta es "Otro", especifique:

103.c El mismo trabajador de atención sanitaria que ofrece tratamiento para TB inicia la terapia antirretroviral a las personas que viven con el VIH y tienen TB: En muchos (entre el 50 % y el 95 %) centros sanitarios

Si la respuesta es "Otro", especifique:

103.d Un mismo trabajador de atención sanitaria monitorea la terapia antirretroviral y el tratamiento para TB de las personas que viven con el VIH y tienen TB: En muchos (entre el 50 % y el 95 %) centros sanitarios

Si la respuesta es "Otro", especifique:

A.3 Poner fin al sida infantil y eliminar la transmisión vertical

Prevención de la transmisión vertical del VIH

104. ¿Tiene su país una política para la repetición de pruebas en mujeres VIH-negativas durante el periodo del embarazo, parto y/o posparto/lactancia?: Sí

104.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuándo se vuelve a realizar la prueba?:

104.1.a Durante el embarazo: Sí

104.1.b En caso afirmativo, indique en qué mes del embarazo:: 3-9 meses

104.1.c En el parto: Sí

104.1.d Posparto/lactancia: Sí

104.1.c.i En caso afirmativo, indique cuántos meses después del parto:: 3 meses

105. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión vertical del VIH?: Sí

105.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique:

Objetivo(s) de la tasa de transmisión vertical (%): ['Menor al 2%']

Año: ['2023']

:

Objetivo(s) para la eliminación (como el número casos por 100 000 habitantes):: ['menor a 0,3 por 1000 nacidos vivos']

Año: ['2024']

106. ¿Está su país aplicando una política de tratamiento universal para las mujeres embarazadas y lactantes que viven con el VIH?: Sí

107. ¿Cuál es el régimen actual recomendado a nivel nacional para los bebés expuestos al VIH para prevenir la transmisión vertical del VIH?

:

Especifique el régimen de profilaxis para recién nacidos:: ['Zidovudina (AZT)']

Duración recomendada del régimen:: ['4 semanas']

107.a ¿Se recomiendan diferentes regímenes para los recién nacidos de alto riesgo?: Sí

107.a.i Si la respuesta es afirmativa, especifíquense los regímenes:: ZT+3TC+NVP o AZT+3TC+RAL

107.a.ii ¿Cómo define la política nacional el concepto de "bebé de alto riesgo"? Seleccione todas las opciones que correspondan: Nacidos de mujeres con infección por VIH establecida que han recibido menos de 4 semanas de terapia antirretroviral en el momento del parto, Nacidos de mujeres con infección por VIH establecida con una carga viral >1000 copias/mL en las 4 semanas anteriores al parto (si se dispone de la carga viral), Nacidos de mujeres con infección por VIH incidente durante el embarazo o la lactancia, Nacidos de mujeres identificadas por primera vez durante el puerperio, con o sin una prueba de VIH negativa prenatalmente

Si la respuesta es "Otro", especifique:

108. ¿Cuenta su país con una recomendación nacional sobre alimentación infantil y juvenil para recién nacidos expuestos al VIH?: Sí, alimentación sustitutiva

108.1 Si se recomienda la lactancia para mujeres VIH-positivas y recién nacidos expuestos al VIH, ¿está especificada su duración recomendada?:

Si la respuesta es afirmativa, especifique la duración en meses:

109. ¿Está la asistencia alimentaria y nutricional integrada en su país a programas de prevención de la transmisión vertical?: Implementada en muchos (del 50 % al 95 %) centros de salud maternoinfantil

Si la respuesta es "Otro", especifique:

110. ¿Cuenta su país con una estrategia nacional sobre intervenciones en el parto para mujeres que viven con el VIH a las que no se ha aplicado previamente la prueba de VIH?: Sí, plenamente implementadas

111. ¿Dispone su país de una política sobre las pruebas de carga viral para las mujeres durante el embarazo, el parto y/o el periodo posparto/lactancia?: Sí

111.1 En caso afirmativo, ¿cuándo se realiza la prueba de carga viral?:

111.1.a Durante el embarazo: Sí

111.1.ai En caso afirmativo, indique en qué mes del embarazo:: Primer y tercer trimestre.

111.2 En el parto: Sí

111.3 Posparto/lactancia: Sí

111.3.a En caso afirmativo, indique cuántos meses después del parto:: Tres meses después del parto

Eliminación de la transmisión vertical de la sífilis

112. ¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión vertical de la sífilis?: Sí, integrado en iniciativas sobre el VIH o en otras iniciativas de eliminación

112.1 En caso afirmativo, ¿cuándo se actualizó por última vez el plan nacional?: 2021

113. ¿Cuenta su país con una política nacional para la detección rutinaria de la sífilis entre mujeres embarazadas?: Sí

113.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de pruebas se utilizan?:: Pruebas de laboratorio no treponemales, Pruebas rápidas duales sobre VIH/sífilis

114. ¿Cuenta su país con directrices nacionales para el tratamiento de las mujeres embarazadas con sífilis?: Sí

114.1 En caso afirmativo, ¿es la penicilina benzatina la primera línea de tratamiento recomendada en las directrices nacionales?: Sí

114.2 En caso afirmativo, ¿permite su política el tratamiento de las mujeres embarazadas con sífilis con penicilina benzatina en los centros de atención primaria, incluidas las clínicas prenatales, por cualquiera de los siguientes profesionales? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Enfermeras,Médicos

115. ¿Cuenta su país con una política nacional de seguimiento clínico de los bebés nacidos de madres seropositivas?: Sí

116. ¿Incluye la definición nacional de la sífilis congénita los partos de mortinatos?: Sí

Prevención de la transmisión vertical del virus de la hepatitis B

117. ¿Dispone su país de un plan nacional para la eliminación de la transmisión vertical del virus de la hepatitis B?: Sí

118. ¿Dispone su país de una política sobre la realización de pruebas de detección del virus de hepatitis B a las mujeres durante el embarazo?: Sí

118.1 En caso afirmativo, ¿cuál es el estado de implementación?: Implemented in many (50-95%) antenatal care clinics

118.1a En caso afirmativo, ¿tienen todas las embarazadas HBsAg positivas acceso a las pruebas de HBeAg o de ADN del virus de la hepatitis B?: Sí

119. ¿Existe en su país una recomendación nacional sobre la realización de pruebas de detección de la hepatitis B a los lactantes expuestos al virus de la hepatitis B?: Sí

119.1 En caso afirmativo, especifique la edad (en meses) a la que se realizan las pruebas del virus de hepatitis B a los lactantes expuestos al virus de la hepatitis B:: A partir de los 9 meses

120. ¿Dispone su país de una política de vacunación universal y oportuna contra la hepatitis B a todos los recién nacidos (en las 24 horas siguientes al nacimiento)?: Sí

120.1 En caso negativo, ¿dispone su país de una política de vacunación oportuna contra la hepatitis B a todos los recién nacidos expuestos al VHB (en las 24 horas siguientes al nacimiento)?:

Diagnóstico infantil

121. ¿Recomiendan sus directrices nacionales que los bebés expuestos al VIH se sometan a las siguientes pruebas? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Prueba de ácido nucleico al nacer,Prueba de ácido nucleico a las 6 semanas,Prueba de anticuerpos a los 18 meses

Si la respuesta es "Otro", especifique:

122. Además de los centros de prevención de la transmisión vertical, ¿realiza alguno de los siguientes centros de su país pruebas del VIH a niños (seleccione todas las opciones que correspondan)?: Salas de hospitalización pediátrica,Clínicas de consulta externa,Clínicas de TB

Si la respuesta es "Otro", especifique:

123. ¿Cuenta su país con una política o recomendaciones para pruebas de detección infantil temprana en puntos de atención sanitaria?: Sí

123.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿está implementada?: Implementada en muchos (entre el 50 % y el 95 %) centros

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Terapia antirretroviral para niños

124. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia de las visitas clínicas para los niños que están establecidos* en la terapia antirretroviral?: Sí

124.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de esas visitas clínicas incluida en la política nacional:: Cada 3 meses

Si la respuesta es "Otro", especifique:

124.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en muchos (del 50 % al 95 %) de los centros de tratamiento

Si la respuesta es "Otro", especifique:

125. ¿Cuenta su país con una política nacional sobre la frecuencia con la que los niños que están establecidos* en la terapia antirretroviral deben recoger los medicamentos antirretrovirales?: Sí

125.1 Si la respuesta es afirmativa, especifique la frecuencia de la recogida de medicamentos antirretrovirales incluida en la política nacional:: Cada 3 meses

Si la respuesta es "Otro", especifique:

125.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en muchos (del 50 % al 95 %) de los centros de tratamiento

Si la respuesta es "Otro", especifique:

126. ¿Se monitorean las cohortes de niños que reciben terapia antirretroviral (por ejemplo, asegurándose de que esos niños siguen vivos y que están recibiendo terapia antirretroviral) en los registros nacionales en intervalos de 6 y 12 meses?: Sí

127. ¿Cuándo se considera en su país que se ha perdido el seguimiento de un niño que haya iniciado terapia antirretroviral?: Cuando no ha sido visto en los servicios de atención para el VIH o en recogidas de medicamentos en farmacia durante 3 meses

128. ¿Cuenta su país con una estrategia o plan para garantizar que no se pierda el seguimiento de adolescentes nacidos con el VIH cuando pasan a ser incluidos en la atención sobre VIH para adultos?: Sí

129. ¿Están los programas de monitoreo del crecimiento y nutricionales para niños integrados en su país en las pruebas y el tratamiento para el VIH?: Implementado en muchos (del 50 % al 95 %) de los centros de tratamiento

Si la respuesta es "Otro", especifique:

A.4 Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas

Violencia

130. ¿Cuenta su país con un plan o estrategia nacional para la igualdad de género?: Sí

130.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un mecanismo nacional con un mandato para supervisar y revisar la implementación?: Sí

130.2 En caso afirmativo, identifique el mecanismo nacional que tiene el mandato de monitorear y revisar la implementación (seleccione todas las opciones que correspondan): Parlamentario, Interministerial, Incluye la participación de grupos de mujeres, Incluye la participación de grupos que combaten la violencia contra la mujer

130.3 En caso afirmativo, ¿las entidades gubernamentales se comprometen presupuestariamente a aplicar el plan o la estrategia sobre igualdad de género?: Sí

131. ¿Cuenta su país con algún plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género* y la violencia contra las mujeres con VIH?: Sí

131.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe un mecanismo nacional con un mandato para supervisar y revisar la implementación?: Sí

131.2 En caso afirmativo, identifique el mecanismo nacional que tiene el mandato de monitorear y revisar la aplicación (seleccione todas las opciones que correspondan): Parlamentario, Interministerial, Incluye la participación de grupos de mujeres, Incluye la participación de grupos que combaten la violencia contra la mujer

132. Si existe legislación sobre violencia doméstica, es:: Incluye todas las formas de violencia familiar y por parte de un compañero sentimental

132.1 Si la legislación incluye la penalización explícita de la violación conyugal, ¿se basan las leyes en la falta de consentimiento, sin exigir pruebas de fuerza física, coacción o resistencia?: Sí, basado en la falta de consentimiento

132.2 Si existe legislación sobre violencia doméstica, ¿ha habido algún proceso penal exitoso por violencia doméstica en los últimos dos años?: Sí

133. ¿Las entidades gubernamentales ofrecen compromisos presupuestarios para la implementación de legislación y planes nacionales que traten la violencia contra la mujer a través de lo siguiente?:

133.a Asignaciones anuales obligatorias por ley: Sí

133.b Asignaciones sectoriales anuales (p. ej.: salud, educación o justicia): Sí

133.c Asignación de financiación y/o incentivos para organizaciones de mujeres u otras organizaciones no gubernamentales para actividades relevantes: Sí

134. ¿La legislación incluye alguna de las siguientes disposiciones en su país en relación con la violencia contra la mujer? (seleccione todas las opciones que correspondan): Mandamientos judiciales para garantizar la seguridad de las supervivientes, Unidad de procesamiento especial en las fuerzas del orden público, Asistencia o servicios jurídicos gratuitos, Unidad o personal de policía especializados para abordar la violencia contra las mujeres

Si la respuesta es "Otro", especifique:

134.1 Si alguna de las disposiciones anteriores está incluida en la legislación, ¿incluye a las mujeres transgénero?: No

135. ¿Existen protocolos nacionales para lo siguiente?:

135.a Profesionales de la salud que tratan con casos de violencia contra la mujer: Sí

135.b Agentes del orden público que tratan con casos de violencia contra la mujer: Sí

135.c Personal educativo que trata con casos de abuso sexual contra los niños y otras formas de violencia de género contra las niñas en entornos escolares. (seleccione todas las opciones que correspondan): Sí, para la violencia contra las niñas, Sí, para la violencia contra los niños, Sí, para la violencia contra los niños con diversidad de género

136. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a las personas que viven con el VIH? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Leyes penales generales que prohíben actos de violencia, Disposiciones legales específicas que prohíben la violencia contra las personas por su pertenencia a una población clave, Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas*, Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia en lugares de trabajo, Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial, Intervenciones contra la tortura y los malos tratos en prisiones y otros entornos cerrados

137. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan): Leyes penales generales que prohíben actos de violencia, Disposiciones legales específicas que prohíben la violencia contra las personas por su pertenencia a una población clave, Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas*, Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia en lugares de trabajo, Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial, Intervenciones contra la tortura y los malos tratos en prisiones y otros entornos cerrados

138. ¿Cuenta su país con, al menos, un punto de prestación de servicios que proporcione elementos de atención integral tras la violación según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)? Los elementos son: (1) asistencia de primera línea, primeros auxilios psicológicos y asistencia psicosocial; (2) anticoncepción de emergencia; (3) profilaxis o tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS); (4) profilaxis postexposición al VIH (PPE); y (5) aborto seguro con todo el rigor de la ley.: Sí, proporciona 4 de los 5 elementos

138.1 En caso afirmativo, ¿qué proporción de centros sanitarios prestan cada uno de los siguientes servicios de la atención integral tras la violación según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)?:

138.1.a Asistencia de primera línea, primeros auxilios psicológicos y asistencia psicosocial: 50-80% de los centros de salud

138.1.b Anticonceptivos de emergencia: >80% de los centros de salud

138.1.c Tratamiento o profilaxis de las infecciones de transmisión sexual (ITS): >80% de los centros de salud

138.1.d Profilaxis postexposición al VIH (PEP): >80% de los centros de salud

138.1.e Aborto seguro con todo el rigor de la ley: No se ofrece en ningún centro de salud

A.5 Liderazgo comunitario

Liderazgo comunitario

139. ¿Existen leyes, reglamentos o políticas que contemplen el funcionamiento de las organizaciones comunitarias en su país? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Es posible el registro de organizaciones dirigidas por personas que viven con el VIH, Es posible el registro de organizaciones dirigidas por profesionales del sexo, Es posible el registro de organizaciones dirigidas por hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Es posible el registro de organizaciones dirigidas por personas transgénero

Si la respuesta es "Otro", especifique:

140. ¿Existen leyes, políticas o reglamentos que permitan el acceso a la financiación de las organizaciones dirigidas por la comunidad? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Social contracting allowing for funding of service delivery by communities from domestic funding,A través de donantes internacionales,Otro

Si la respuesta es "Otro", especifique: Sí existen leyes que permitan el acceso a la financiación gubernamental a las ONG.

141. ¿Se incluye a representantes de organizaciones dirigidas por la comunidad en el mecanismo nacional de coordinación del VIH o equivalente?: There is a national HIV coordinating mechanism or equivalent, and it includes representatives of community-led organizations

142. ¿Pueden las organizaciones comunitarias prestar legalmente alguno de los siguientes servicios?: Vinculación al tratamiento del VIH,Apoyo a la adherencia y la retención,Alfabetización para el tratamiento,Distribución de medicamentos antirretrovirales,Distribución de preservativos y lubricantes,Pruebas del VIH,Información sobre educación sexual y VIH basada en la preparación para la vida*

Participación

143. ¿Participan las personas que viven con el VIH* en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: Sí

144. ¿Participan las mujeres que viven con el VIH* en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con la prevención de la transmisión de madre a hijo?: Sí

145. ¿Participan los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres* en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: Sí

146. ¿Participan* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: Sí

147. ¿Participan* las personas que se inyectan drogas en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: No

148. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?: Sí

149. ¿Participan* en la elaboración de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país personas que han estado o están en prisión o en otros entornos cerrados?: No

150. ¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) de su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?: Sí

150.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional frente al VIH?

	¿Existe?	¿Participan las personas jóvenes en este ámbito?	Otro, especifique
Equipos técnicos para el desarrollo, la revisión y la actualización de las estrategias y planes nacionales sobre el sida			
Equipos técnicos para el desarrollo o la revisión de programas que estén relacionados con el acceso de los jóvenes a servicios de pruebas, tratamiento, atención y apoyo para el VIH			
Autoridad coordinadora nacional sobre el sida u equivalente, con un amplio mandato multisectorial			
Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial			
Entidad de asesoramiento de la comunidad para hospitales, clínicas y/o proyectos de investigación			
Otro			

A.6.A Realización de los derechos humanos y eliminación del estigma y la discriminación (punitivas)

Leyes punitivas

151. ¿Tiene su país leyes a nivel nacional o subnacional que penalicen la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH?: No, pero la ley general se ha utilizado para procesar casos en los últimos 10 años

151.1 Si se criminaliza la no revelación del estado serológico respecto al VIH, su exposición o transmisión, ya sea en virtud de una ley específica o de una ley general, ¿se limita a los casos en los que la persona sabe que tiene el VIH, tiene la intención de transmitirlo y lo transmite realmente, de acuerdo con las recomendaciones de 2013 sobre el fin de la penalización excesivamente amplia de la no revelación del estado serológico respecto al VIH, su exposición y transmisión?:

151.2 Si la no revelación del estado serológico respecto al VIH, su exposición o transmisión están criminalizadas, ¿hay partes del país donde la no revelación del estado serológico respecto al VIH, su exposición o transmisión no están penalizadas?:

151.3 Si la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH están penalizadas, ¿ha habido moratorias en la ley en los dos últimos años?:

151.4 Si la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH están tipificadas como delito, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

151.5 Si se penaliza la no revelación, la exposición o la transmisión del VIH, ¿se incluye la transmisión vertical?:

152. ¿Se menciona el VIH como factor agravante en la ley?:

153. ¿Existen leyes a nivel nacional o subnacional que penalicen a las personas transgénero (por ejemplo, por hacerse pasar por el sexo opuesto o por travestirse)?: No

153.1 En caso afirmativo, ¿hay alguna parte del país donde las personas transgénero no estén criminalizadas?:

153.2 Si se penaliza a las personas transgénero, ¿ha habido moratorias en la ley en los dos últimos años?:

153.3 Si las personas transgénero están criminalizadas, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar a las personas transgénero en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

154. ¿Está el trabajo sexual tipificado como delito o sometido a otras normativas punitivas en su país a nivel nacional o subnacional? Seleccione todas las opciones que correspondan.: El trabajo sexual no está sujeto a regulaciones punitivas y no está penalizado en ningún lugar del país

154.1 En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 154, ¿hay partes del país en las que el trabajo sexual no esté penalizado o sujeto a normas punitivas?:

154.2 Si existen leyes que penalizan cualquier aspecto del trabajo sexual, ¿ha habido alguna moratoria en los dos últimos años?:

154.3 Si el trabajo sexual está penalizado, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizarlo en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

155. ¿Existen en su país leyes a nivel nacional o subnacional que penalicen los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo en privado?: No, las leyes que penalizan los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo han sido despenalizadas o nunca han existido en ningún lugar del país

155.1 En caso afirmativo, ¿hay partes del país en las que los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo en privado no están penalizados?:

155.2 Si existen leyes que penalizan actos sexuales entre personas del mismo sexo, ¿ha habido alguna moratoria en los dos últimos años?:

155.3 Si los actos sexuales entre personas del mismo sexo están penalizados, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar los actos sexuales entre personas del mismo sexo en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

156. ¿Son el consumo y/o la posesión de drogas para uso personal un delito en su país a nivel nacional o subnacional?: No, no es un delito en ningún lugar del país

156.1 En caso afirmativo, ¿hay partes del país en las que no son delito?:

156.2 Si el consumo de drogas y/o la posesión para uso personal son delitos penales, ¿ha habido alguna moratoria en los últimos dos años?:

156.3 Si el consumo de drogas y/o la posesión para uso personal son delitos penales, ¿se ha iniciado o está en proceso alguna acción legal para despenalizar el consumo de drogas o la posesión para uso personal en los últimos dos años? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

156.4 Si el consumo y/o la posesión de drogas son infracciones administrativas/no penales, ¿se aplica alguna de las siguientes medidas en su país para las personas que consumen drogas? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Otro, especifique:

157. ¿Utiliza la ley umbrales de cantidad para estimar la posesión de drogas para uso personal?: Sí, para todas las drogas

157.1 En caso afirmativo, ¿especifica la ley la cantidad de droga que se considera de uso personal?: Sí

157.2 En caso afirmativo, esa cantidad es::

158. ¿Aplica su país una detención obligatoria o rehabilitación obligatoria de las personas que usan drogas en instalaciones cerradas?: No

159. Aparte de la criminalización, ¿tiene su país otras leyes punitivas que afecten a las poblaciones clave (personas transgénero, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, profesionales del sexo y personas que consumen drogas)? Seleccione todas las opciones que correspondan.: No

Sí, otras (especifique)::

A.6.B Realización de los derechos humanos y eliminación del estigma y la discriminación

Protecciones legales

160. ¿Cuenta su país con leyes que ofrecen protección contra la discriminación por el estado serológico?: Sí, protecciones constitucionales o legislativas que ofrecen protección contra la discriminación por el estado serológico de acuerdo con otra situación (como salud, discapacidad u "otra situación")

160.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿se aplican protecciones constitucionales o legislativas a cualquiera de los siguientes ámbitos? (seleccione todas las opciones que correspondan): Empleo, Educación, Sanidad, Provisión de otros bienes y servicios

Otro (especifique)::

161. ¿Cuenta su país con protecciones constitucionales o legislativas contra la discriminación por motivos de identidad de género?: No

Especifique::

Otro (especifique)::

162. ¿Cuenta su país con leyes de reconocimiento de género o políticas que permiten el cambio de sexo?: No

162.1 En caso afirmativo, ¿es legalmente posible cambiar el indicador de género en alguno de los siguientes documentos? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

162.2 Si la respuesta a la pregunta 162 es afirmativa, ¿es legalmente posible cambiar el indicador de género en alguno de los siguientes documentos (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

163. ¿Es legalmente posible cambiarse el nombre por uno de otro género en cualquiera de los siguientes documentos? (seleccione todas las opciones que correspondan): No

164. ¿Existen en su país protecciones constitucionales o legislativas contra la discriminación basada en la implicación en el trabajo sexual (por ejemplo, ocupación o profesión)?: No

Especifique::

Otro (especifique)::

165. ¿Existen en su país protecciones constitucionales o legislativas contra la discriminación por motivos de orientación sexual?: No

Especifique::

Otro (especifique)::

166. ¿Existen en su país protecciones constitucionales o legislativas contra la discriminación por consumo o posesión de drogas?: No

Especifique::

Otro (especifique)::

167. ¿Existen referencias de apoyo explícitas en políticas nacionales sobre la reducción de daños?:

167.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿las políticas abordan las necesidades específicas de las mujeres que se inyectan drogas?:

168. ¿Es el consumo y/o la posesión de drogas una base legal para retirar la custodia de los hijos a los padres?:

Consentimiento parental y conyugal para el acceso a servicios

169. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes (menores de 18 años) puedan acceder a métodos anticonceptivos hormonales o de larga duración?:

Otras (especifique)::

169.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a anticonceptivos hormonales o de larga duración sin consentimiento parental?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

170. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes (menores de 18 años) puedan acceder a pruebas sobre el VIH y recibir los resultados?:

Otras (especifique)::

170.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a pruebas del VIH y recibir los resultados sin consentimiento parental? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

171. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes (menores de 18 años) puedan acceder a pruebas de autodiagnóstico del VIH y recibir los resultados?:

Otras (especifique)::

171.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a pruebas de autodiagnóstico del VIH y recibir los resultados sin consentimiento parental? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

172. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento parental para que los/las adolescentes (menores de 18 años) puedan acceder a tratamiento para el VIH?:

Otras (especifique)::

172.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a tratamiento para el VIH sin consentimiento parental? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

173. ¿Permite la ley que los adolescentes (menores de 18 años) accedan a los siguientes servicios?:

173.a Terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos: No

173.a.i En caso afirmativo, ¿se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder?:

173.a.ii En caso afirmativo, especifique hasta qué edad se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder::

173.b Programas de agujas y jeringas: No

173.b.i En caso afirmativo, ¿se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder?:

173.b.ii En caso afirmativo, especifique hasta qué edad se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder::

173.c Naloxona: No

173.c.i En caso afirmativo, ¿se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder?:

173.c.ii En caso afirmativo, especifique hasta qué edad se requiere el consentimiento de los padres/tutores para acceder::

174. ¿Existen en su país leyes o políticas que exijan el consentimiento de los padres o tutores para que los adolescentes menores de 18 años puedan acceder a la profilaxis preexposición (PrEP)?:

Otras (especifique)::

174.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿existen excepciones para que los adolescentes menores de la edad de consentimiento legal puedan acceder a tratamiento para el VIH sin consentimiento parental? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

175. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva?: No

176. ¿Cuenta su país con legislación que exija el consentimiento del cónyuge para que las mujeres casadas puedan acceder a la prueba de VIH?: No

Estigma y discriminación

178. En los últimos 2 años, el gobierno proporcionó formación a los siguientes grupos sobre derechos humanos y no discriminación en relación con poblaciones clave en al menos el 25 % de las provincias/regiones/distritos (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley: Profesionales del sexo, Hombres gays y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas transgénero, Presos y otras personas privadas de libertad

b) Para miembros del sistema judicial: Profesionales del sexo, Hombres gays y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas transgénero, Presos y otras personas privadas de libertad

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios): Profesionales del sexo, Hombres gays y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas transgénero, Presos y otras personas privadas de libertad

d) Para trabajadores sanitarios: Profesionales del sexo, Hombres gays y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas transgénero, Presos y otras personas privadas de libertad

e) Para educadores: Profesionales del sexo, Hombres gays y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Personas transgénero, Presos y otras personas privadas de libertad

179. ¿Cuenta su país con programas de formación sobre prevención de la violencia contra la mujer y de la violencia de género para los siguientes grupos?:

:

a) Para policía y otros funcionarios encargados de la aplicación de la ley: Sí, como parte recurrente de la formación en el puesto de trabajo a nivel nacional

b) Para miembros del sistema judicial: Sí, como parte recurrente de la formación en el puesto de trabajo a nivel nacional

c) Para funcionarios electos (legisladores/parlamentarios): Sí, como parte recurrente de la formación en el puesto de trabajo a nivel nacional

d) Para trabajadores sanitarios: Sí, como parte recurrente de la formación en el puesto de trabajo a nivel nacional

e) Para educadores: Sí, como parte recurrente de la formación en el puesto de trabajo a nivel nacional

180. ¿Existen mecanismos públicos de rendición de cuentas establecidos por el gobierno a través de los cuales las personas puedan presentar quejas y solicitar reparación en casos de discriminación relacionada con el VIH (basada en la percepción del estado serológico respecto al VIH y/o la pertenencia a cualquier grupo de población clave)? Los ejemplos incluyen (pero no se limitan a) una institución nacional de derechos humanos, un defensor del pueblo, un tribunal o una comisión.: Sí, (descríbalos):

describa:: defensoria del pueblo

181. ¿Dispone su país de alguno de los siguientes mecanismos de vigilancia y aplicación de los derechos humanos?:

181.a Existencia de instituciones nacionales independientes y funcionales para la promoción y protección de los derechos humanos, incluidas comisiones de derechos humanos, comisiones de reforma legislativa, organismos de vigilancia y defensores del pueblo que tengan en cuenta en su trabajo las cuestiones relacionadas con el VIH.: Sí

181.b Supervisión de la aplicación de las observaciones finales y recomendaciones de los órganos de vigilancia de los tratados y del Examen Periódico Universal (EPU):

182. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos asequibles (seleccione todas las opciones que correspondan)?: Sí, sistemas de asistencia jurídica financiados con fondos públicos aplicables a los casos de VIH,Sí, servicios legales ofrecidos por centros jurídicos (universitarios)

Si la respuesta es "Sí, otros", descríbalos:

A.7 Cobertura sanitaria universal e integración

Cáncer de cuello de útero

183. ¿Se han adoptado en las directrices nacionales de su país las recomendaciones de las directrices de 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la detección de lesiones precancerosas cervicales para la prevención del cáncer de cuello uterino entre las mujeres que viven con el VIH?: Sí

183.a En caso afirmativo, indique las recomendaciones de la OMS adoptadas (seleccione todas las que procedan):: Citología Se utiliza como prueba de detección primaria como parte de un enfoque de detección y tratamiento,Citología Se utiliza como prueba de detección primaria como parte de un enfoque de detección, triaje y tratamiento.,El intervalo de detección recomendado para la citología/VIA es cada 3 años

Si la respuesta es "Sí, otros", descríbalos:

184. ¿Dispone su país de una estrategia o plan de acción nacional para la prevención y el control de las infecciones de transmisión sexual?: Sí

184.1 En caso afirmativo, ¿en qué año se actualizaron por última vez?: Antes 2020

185. ¿Dispone su país de directrices nacionales para la gestión de casos de infecciones de transmisión sexual?: Sí

185.1 En caso afirmativo, ¿en qué año se actualizaron por última vez?: Antes 2020

186. ¿Dispone su país de directrices nacionales para el tratamiento de la Neisseria gonorrhoeae?: No

186.1 En caso afirmativo, ¿en qué año se actualizaron por última vez?:

187. ¿Se realiza en su país el monitoreo de la resistencia a antimicrobianos gonocócicos?: No

Protección social

188. ¿Cuenta su país con estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados*?: Sí, pero no están siendo implementados

188.1 Si la respuesta es afirmativa::

a) ¿Hacen referencia al VIH?:

b) ¿Reconocen a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?:

b.i. En caso negativo, describa las condiciones en las que las personas que viven con el VIH pueden acceder a las prestaciones de protección social::

c) ¿Reconocen a grupos de poblaciones clave (profesionales del sexo, hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas transgénero y personas en prisión) como beneficiarios clave?:

c.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué grupos de poblaciones clave se reconocen como beneficiarios clave? (seleccione todas las opciones que correspondan):

c.ii. Si la respuesta es negativa, describa las condiciones en las que las poblaciones clave pueden acceder a las prestaciones de protección social::

d) ¿Reconocen a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?:

e) ¿Reconocen a los niños afectados por el VIH como beneficiarios clave?:

f) ¿Reconocen a las familias afectadas por el VIH como beneficiarios clave?:

g) ¿Tratan la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?:

189. ¿Se incluye a los representantes del Programa Nacional sobre Sida o su equivalente en el mecanismo o plataforma de coordinación de protección social*?: Existe un mecanismo o plataforma de coordinación de la protección social, pero no incluye a representantes del Programa Nacional sobre el Sida o su equivalente

190. ¿Están siendo implementados en el país programas de transferencias de efectivo* para mujeres jóvenes, de entre 15 y 24 años de edad?: No

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

191. ¿Qué flexibilidades* de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio relativos a la salud pública se incorporan en la legislación nacional de su país sobre propiedad industrial y/o intelectual, y cuáles se han utilizado para favorecer el acceso a productos relacionados con el VIH y/o a otros productos sanitarios?

	¿Están incorporadas en la legislación nacional sobre propiedad industrial/intelectual?	Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué año se utilizaron por última vez?	Si la respuesta es afirmativa, ¿para qué productos médicos se han utilizado?
Agotamiento de derechos (importación paralela) (art. 6)			
Materias patentables (art. 27)			
Excepción para usos de investigación y experimentación (art. 30)			
Excepción regulatoria (Bolar) (art. 30)			
Licencias obligatorias (art. 31)			
Uso público no comercial (uso gubernamental) (art. 31)			
Ámbito de protección para datos de pruebas farmacéuticas (art. 39.3)			
Legislación sobre competencia (art. 40)			
Periodos de transición (artículos 65.2, 65.4 y 66.1)			

Seguro médico universal

192. ¿Cuenta su país con un programa de seguro médico universal?: No

192.1 En caso negativo, ¿su país está pasando a un programa de seguro médico universal?: No

192.2 En caso de respuesta afirmativa a las preguntas 192 o 192.1, ¿el paquete de prestaciones incluye lo siguiente?:

192.2.a Medicamentos antirretrovirales:

192.2.b Profilaxis previa a la exposición (PPrE):

Estrategia

193. ¿Cuenta su país con una estrategia o política nacional que guíe su respuesta al sida?: Sí, una estrategia o política de salud que integra la respuesta al sida

Si la respuesta es "Otro", especifique:

193.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ha sido revisada en los dos últimos años esa estrategia o política nacional sobre el sida?: Sí

193.2 Si la respuesta a 193 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional que establece la respuesta al sida aborda de forma expresa los siguientes grupos de poblaciones clave o grupos vulnerables? (seleccione todas las opciones que correspondan):: Adolescentes de poblaciones clave,Hombres gays y hombres que tienen sexo con otros hombres,Presos y otras personas privadas de libertad,Personas que usan drogas inyectables,Profesionales del sexo (hombres y mujeres),Personas transgénero,Desplazados internos,Migrantes

193.3 Si la respuesta a 193 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional que guía la respuesta al sida hace lo siguiente? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Incluir específicamente planes o actividades explícitas que aborden las necesidades de las poblaciones clave,Incluir específicamente planes o actividades explícitas que aborden el estigma y la discriminación relacionados con el VIH,Se basa en la evidencia más reciente sobre la epidemia nacional de VIH y en la situación de la respuesta nacional frente al sida,Integra aportaciones a través de un proceso multisectorial, que incluye diversos sectores del gobierno, y también a socios no gubernamentales,Aprovechar las pruebas aportadas por las organizaciones comunitarias

193.4 Si la respuesta a 193 es afirmativa, ¿la estrategia o política nacional que establece la respuesta frente al sida incluye intervenciones transformadoras e intervenciones de género*, entre ellas intervenciones dirigidas a

tratar las intersecciones que se producen entre violencia de género y VIH?: No

193.4.a Si la respuesta a 193.4 es afirmativa, ¿esa estrategia o política nacional que establece la respuesta frente al sida incluye secciones presupuestarias dedicadas a la implementación de intervenciones transformadoras en materia de género*?:

Monitoreo y evaluación

194. ¿Cuenta su país con un plan o estrategia de monitoreo y evaluación para el VIH?: Sí, una estrategia o plan de monitoreo y evaluación para el VIH independiente

Si la respuesta es "Otro", especifique:

194.1 En caso afirmativo, ¿cuándo se actualizó por última vez?: 2021

194.2 En caso afirmativo, ¿integra indicadores* sensibles al género para ayudar a comprender las desigualdades basadas en el género y la desigualdad de género?: Sí

194.3 ¿Cuenta su país con un equipo de trabajo para la calidad de los datos que revise los datos de los programas subnacionales al menos semestralmente?: Sí

Sistema de Información sanitaria

195. ¿Están disponibles de manera rutinaria los resultados de las pruebas de carga viral a nivel del paciente dentro del sistema de información sanitaria?: Sí, totalmente electrónico

195.1 ¿Se incluyen datos sobre la cascada de tratamiento en el sistema de información sanitaria a nivel de distrito?: Mujeres embarazadas sometidas a la prueba durante la atención prenatal y resultado de la prueba, Mujeres que ya están en tratamiento antirretroviral en la primera visita de atención prenatal, El número de personas que se sometieron a la prueba del VIH, El número de personas que han dado positivo en la prueba del VIH, Número de personas a las que se les ha diagnosticado recientemente el VIH y que reciben terapia antirretrovírica, El número de personas con terapia antirretroviral que están suprimidas viralmente

195.2 ¿Los datos de las organizaciones comunitarias sobre los servicios que prestan están integrados en el sistema nacional de información sanitaria o equivalente?: Sí, las organizaciones dirigidas por la comunidad se incluyen como un tipo de proveedor para el desglose de los indicadores existentes

Vigilancia

196. ¿En su país los diagnósticos de casos de VIH se notifican por ley?: Sí

197. ¿Cuenta el país con un sistema nacional de vigilancia de casos de VIH*?: Sí

197.1 En caso afirmativo, ¿incluye el sistema nacional de vigilancia de casos de VIH lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan)?: Datos a nivel individual de cada persona diagnosticada de VIH, Recopilación de datos de diferentes fuentes (laboratorios, registros de pruebas y tratamientos) para promover la exhaustividad de los datos sobre casos de VIH., Vinculación de datos a nivel individual para eliminar registros duplicados, Recuento de CD4 en el momento del diagnóstico del VIH, Inicio de la terapia antirretroviral, Resultados de la primera prueba de carga viral y de seguimiento, Embarazo en mujeres seropositivas, Muerte

Sistemas de seguimiento de pacientes

198. ¿El país ha actualizado los indicadores y herramientas del sistema de monitoreo de pacientes usando la guía Consolidated guidelines on personcentered HIV patient monitoring and case surveillance de la OMS 2022?: Sí, plenamente

Códigos de identificación únicos para pacientes

:

199. ¿Su país cuenta con un método para vincular y eliminar información de salud duplicada de los pacientes dentro y entre clínicas (como vincular registros usando identificadores únicos y/o información de identificación personal, como datos biométricos) para los siguientes servicios?

	Método para identificar y quitar información de salud duplicada	En caso afirmativo, especifique como se enlazan los datos	Si la respuesta es "Otros", especifique
Servicios de tratamiento	Sí, armonizados a nivel nacional	Identificador único específico para VIH	
Servicios de pruebas	Sí, armonizados a nivel nacional	Identificador único específico para VIH	
Servicios de laboratorio	Sí, armonizados a nivel nacional	Identificador único específico para VIH	

Servicios de prevención de VIH diseñados para cualquier grupo de población clave para rastrear la adopción de métodos de prevención combinados

	Método para identificar y quitar información de salud duplicada	En caso afirmativo, especifique como se enlazan los datos	Si la respuesta es "Otros", especifique	"Si OTROS en los servicios de prevención del VIH diseñados para cualquier grupo de población clave para el seguimiento de la aceptación de la prevención combinada, por favor, especifique"
hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Sí, armonizados a nivel nacional	Identificador único específico para VIH		
Profesionales del sexo	Sí, armonizados a nivel nacional	Identificador único específico para VIH		
Personas transgénero	Sí, armonizados a nivel nacional	Identificador único específico para VIH		
Personas que se inyectan drogas	No			
Otro				

199.1 En caso de respuesta afirmativa a alguna de las preguntas anteriores, ¿la política de identificadores únicos también prevé protecciones de la privacidad de los datos legalmente exigibles?: Sí

95-95-95

200. ¿Cuándo se llevó a cabo la revisión de la calidad de los datos más reciente con el fin de determinar la precisión del número reportado de personas que reciben tratamiento a nivel nacional?: Se completó el año pasado y los resultados están disponibles

200.1 Si se llevó a cabo una revisión de la calidad de los datos el año pasado, ¿se han usado los resultados para ajustar el número reportado de personas que reciben tratamiento en el Indicador 2.2?: Sí

201. ¿Cuándo se llevó a cabo la revisión más reciente de la calidad de los datos para determinar la exactitud del número de personas que, según los informes, tienen cargas virales suprimidas?: Se completó el año pasado y los resultados están disponibles

201.1 Si se ha llevado a cabo una revisión de la calidad de los datos en el último año, ¿se ha utilizado para ajustar el número de personas que tienen cargas víricas suprimidas notificadas en el indicador 2.3?: Sí

Uso de datos

202. ¿Se están realizando revisiones de los datos de la cascada de tratamiento del VIH?: Sí

202.1 En caso afirmativo, seleccione la frecuencia con la que se realizan las revisiones de los datos de la cascada de tratamiento del VIH.: Anualmente

Si la respuesta es "Otro", especifique:

202.2 En caso afirmativo, ¿a qué nivel se realizan las revisiones de datos? Seleccione todas las opciones que correspondan.: Nacional

B.1 Prevención combinada del VIH para todos

Prevención del VIH para las personas que se inyectan drogas

- 1. ¿Hay en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas operativos?:**
- 2. ¿Está disponible en su país la naloxona (que se utiliza para neutralizar casos de sobredosis de opiáceos) a través de distribución comunitaria?:**
- 3. ¿Existen programas de terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos operativos en su país?:**

Servicios de prevención del VIH en las prisiones

- 4. ¿Hay operativos en su país programas de distribución de agujas y jeringuillas en las prisiones?:**
- 5. ¿Existen programas de terapia de mantenimiento con agonistas opiáceos en las prisiones y otros entornos cerrados de su país?:**
- 6. ¿Las personas en prisión de su país tienen acceso a preservativos y lubricantes?:**
- 7. ¿Hay disponible en su país terapia antirretroviral para todas las personas en prisión que viven con el VIH?:**
- 8. ¿Se realizan pruebas del VIH en las cárceles y otros entornos cerrados de su país?:**
 - 8.a ¿Se llevan a cabo con el consentimiento informado de las personas en prisión?:**
 - 8.b ¿Se ofrecen de manera sistemática en el momento del ingreso y/o la salida?:**
 - 8.c ¿Son gratuitas?:**
 - 8.d ¿Son confidenciales?:**
 - 8.e ¿Están disponibles en cualquier fase de la situación de privación de libertad?:**
 - 8.f ¿Se acompañan de información relevante y accesible?:**
 - 8.g ¿Se acompañan de asesoramiento confidencial para antes y después de la prueba?:**
 - 8.h ¿Son accesibles por igual para todas las personas en prisión?:**
 - 8.h.i Si la respuesta es negativa, ¿qué personas en prisión no disfrutan de ese acceso igualitario?:**
- 9. ¿Está disponible el tratamiento de la hepatitis C (con medicamentos antivirales de acción directa) en las prisiones y otros entornos cerrados de su país?:**

Profilaxis previa a la exposición (PrEP)

10. ¿Está la profilaxis previa a la exposición disponible en su país a través de alguno de los siguientes medios? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

Si la respuesta es "Otro", especifique:

11. ¿Alguna de las siguientes barreras limita el acceso a la profilaxis previa a la exposición en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan)::

B.2 Cumplimiento del objetivo 95-95-95 para pruebas de detección del VIH y el tratamiento del VIH

12. ¿Ofrece o implementa su país alguna forma de pruebas de VIH obligatorias?:

Si la respuesta es afirmativa, favor incluir una breve explicación sobre en qué casos se llevan a cabo prácticas de pruebas obligatorias sobre VIH y cuáles son los grupos afectados::

13. ¿En qué lugares hay disponibles en su país pruebas de carga viral?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

14. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la retención en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

15. ¿Se ha implementado alguno de los siguientes servicios de apoyo a la adherencia en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

16. ¿Tienen acceso los migrantes a los servicios de VIH (pruebas, medicamentos antirretrovirales y atención sanitaria)?:

B.3 Poner fin al sida infantil y eliminar la transmisión vertical

17. ¿Participan* las mujeres que viven con el VIH en su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relativas a la prevención de la transmisión vertical del VIH?:

18. En el contexto de los programas de prevención de la transmisión vertical del VIH en su país, ¿existen informes (o documentación) sobre alguno de los siguientes aspectos? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otras violaciones de los derechos humanos* graves y sistemáticas", descríbalas::

18.1 Si existen informes sobre alguna de esas situaciones que se den en su país, ¿está llevando a cabo su gobierno actuaciones de diligencia debida para darles respuesta?:

B.4 Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas

19. ¿Incluye la legislación de su país alguna de las siguientes disposiciones en relación con la violencia contra las mujeres? (Seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

20. ¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger de la violencia a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan):

B.5 Liderazgo comunitario

21. ¿Impone su país restricciones al registro y funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

22. ¿Tiene su país legislación, políticas o regulaciones que obstaculicen el acceso a financiación para las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias para el trabajo relacionado con el VIH? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", descríbalas:

Participación

23. ¿Participan las personas que viven con el VIH* en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

24. ¿Participan las mujeres que viven con el VIH* en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con la prevención de la transmisión de madre a hijo?:

25. ¿Participan* los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en el desarrollo de políticas, directrices y/o estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

26. ¿Participan* los y las profesionales del sexo en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

27. ¿Participan* las personas que se inyectan drogas en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

28. ¿Participan* las personas transgénero en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

29. ¿Participan* los antiguos y actuales personas en prisión en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias nacionales relacionadas con su salud en su país?:

30. ¿Participan* las personas jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) de su país en el desarrollo de políticas, directrices y estrategias relacionadas con su salud en su país?:

30.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿participan* las personas jóvenes en alguno de los siguientes ámbitos de toma de decisiones en la respuesta nacional frente al VIH?

	¿Existe?	¿Participan las personas jóvenes en este ámbito?	Otro, especifique
Equipos técnicos para el desarrollo, la revisión y la actualización de las estrategias y planes nacionales sobre el sida			
Equipos técnicos para el desarrollo o la revisión de programas que estén relacionados con el acceso de los jóvenes a servicios de pruebas, tratamiento, atención y apoyo para el VIH			
Autoridad coordinadora nacional sobre el sida u equivalente, con un amplio mandato multisectorial			
Mecanismo de coordinación nacional del Fondo Mundial			
Espacios de coordinación de la sociedad civil para grupos de población afectados por el VIH			
Entidad de asesoramiento de la comunidad para hospitales, clínicas y/o proyectos de investigación			
Otro			

B.6 Realización de los derechos humanos y eliminación del estigma y la discriminación

Actuaciones de aplicación de la ley

31. En su país, en los últimos dos años, ¿personas que viven con el VIH han sido detenidas o procesadas por no revelar su estado serológico, exponerse o transmitirlo?:

32. En su país, en los últimos dos años, ¿personas que viven con el VIH han sido detenidas o procesadas por exposición o transmisión vertical?:

33. ¿Puede utilizarse la posesión de agujas o jeringuillas sin prescripción médica como evidencia del consumo de drogas o ser causa de detención en su país?:

34. En su país, en los últimos dos años, ¿ha habido personas transgénero que hayan sido detenidas o procesadas por expresar su identidad de género?:

35. En su país, en los últimos dos años, ¿ha habido personas que hayan sido detenidas o procesadas en relación con la venta de sexo?:

36. En su país, en los últimos dos años, ¿ha habido personas que hayan sido detenidas o procesadas por actos homosexuales consentidos?:

37. En su país, en los últimos dos años, ¿ha habido personas que hayan sido detenidas o procesadas por posesión o consumo de drogas?:

38. Si la posesión de cualquier droga para uso personal no es un delito penal en su país, ¿existen disposiciones legales o administrativas para el consumo y/o la posesión de drogas para uso personal que supongan una forma de castigo? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

39. ¿Se han utilizado con éxito las prohibiciones constitucionales o legislativas de la discriminación para proteger o defender los derechos de las personas transgénero en los últimos dos años en alguno de los siguientes casos (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

40. Si se reconoce legalmente un cambio de un marcador de género, ¿alguno de los obstáculos siguientes limita su aplicación?:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

41. ¿Se han usado correctamente estas prohibiciones constitucionales de discriminación para proteger o defender los derechos de los profesionales del sexo en los últimos dos años en cualquier de las siguientes instancias? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

42. ¿Se han usado correctamente las prohibiciones constitucionales o legislativas sobre la discriminación para proteger o defender los derechos de las personas según su orientación sexual en los últimos dos años en cualquiera de las siguientes instancias? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

43. ¿Se han usado correctamente estas disposiciones que establecen protecciones para proteger o defender los derechos de las personas que consumen drogas en los últimos dos años en cualquiera de las siguientes instancias? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

44. ¿Actúa alguno de los siguientes elementos como obstáculo para hacer uso de las protecciones constitucionales u otras legislaciones en su país? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

Conocimiento de los derechos

45. En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?:

45.1 Si la respuesta es afirmativa::

45.1a ¿Se proporcionó algún tipo de financiación pública para apoyar la formación?:

45.1b ¿Quién impartió la formación? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

Si la respuesta es "Otro", especifique:

46. ¿Existe alguno de los obstáculos siguientes para ofrecer la formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

Si la respuesta es "Otros", descríbalos:

Mecanismos de rendición de cuentas

47. ¿Existen mecanismos establecidos por la comunidad y/u organizaciones no gubernamentales para registrar y dar respuesta a denuncias individuales de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación

percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave)? Ejemplos de esos mecanismos son estructuras culturales tradicionales u organizaciones no gubernamentales con formación en mediación para dar respuesta a esas denuncias.:

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos::

48. ¿Tiene su país mecanismos en vigor para promover el acceso a servicios jurídicos asequibles? Seleccione todas las opciones que correspondan.:

la respuesta es "Sí, otros", descríbalos:

49. ¿Presenta su país alguno de los siguientes obstáculos para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia (seleccione todas las opciones que correspondan)?:

La respuesta es "Otro", especifique:

50. ¿Existen en su país obstáculos particulares para el acceso a la justicia por parte de grupos de población clave, personas que viven con el VIH u otras personas afectadas por el VIH:

Si la respuesta es afirmativa, descríbalos y ofrezca detalles sobre su alcance (es decir, a nivel nacional)::

B.7 Cobertura sanitaria universal e integración

51. ¿Alguno de los siguientes obstáculos limitan el acceso a programas de protección social* en su país? (seleccione todas las opciones que correspondan):

Si la respuesta es "Otro", especifique:

IV Encuesta del Servicio de Medicamentos y Pruebas Diagnósticas del Sida (AMDS) sobre el uso de antirretrovirales (ARV) y de laboratorios, y aplicación de las guías de la OMS pertinentes

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Encuesta sobre el uso de ARV

Otra herramienta/fuente de medición::

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Nombre de persona que rellenó el cuestionario: Dra. Elena Candía - Dra. Giulia Cipolla - Dra. Stela Samaniego

Cargo: Directora Jefa del Dpto. Vigilancia Jefa del Dpto. Atención Integral

Institución: PRONASIDA

Dirección de correo electrónico: estrategica.pronasida@mspbs.gov.py

Teléfono: 021 204 604

1A Visión general del tratamiento antirretroviral

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: DATOS PROGRAMATICOS PLANILLAS DE TRATAMIENTO ARV DE LOS CENTROS DE ATENCION SAI PLANILLA DE RETIRO DE MEDICAMENTOS ARV

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Pregunta 1. Número total de adultos y niños en tratamiento antirretroviral a finales de 2023: 12754

1B Tratamiento antirretroviral (tar) de adultos y adolescentes (≥ 10 años) vih positivos, incluyendo embarazadas

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: DATOS PROGRAMATICOS PLANILLAS DE TRATAMIENTO ARV DE LOS CENTROS DE ATENCION SAI PLANILLA DE RETIRO DE MEDICAMENTOS ARV

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Pregunta 2. Informe sobre el número de pacientes adultos y adolescentes (≥ 20 años) VIH positivos que recibían tratamiento de primera, segunda o tercera línea a fines de diciembre del 2023

	Número total de adultos y adolescentes (≥ 10 años) VIH positivos por línea de tratamiento a fines de diciembre del 2024
Primera línea	11691
Segunda línea	788
Tercera línea/rescate	191
TOTAL	12670

Pregunta 3. Indique el número de personas por régimen de primera línea utilizado en adultos y adolescentes (≥ 10 años) a finales de 2023, incluidas las mujeres embarazadas que reciben TAR.

N.B. Por favor, empiece por los regímenes con números más altos

Tratamientos antirretrovirales de primera línea	Número de adultos y adolescentes (de ≥ 10 años) que viven con el VIH y reciben este régimen de TAR a finales de 2023.	TOTAL
3TC+DTG	4	4
ABC/3TC+ATV/R	81	81
ABC/3TC+DTG	158	158
ABC/3TC+EFV	1	1
ABC/3TC+LPV/r	1	1
ABC/3TC+RAL	10	10
ABC/3TC+TDF	1	1
ABC/3TC(JBE)+ATV/r	1	1
ABC/3TC(JBE)+DTG	1	1
ABC+3TC+ATV/r	17	17
ABC+3TC+DTG	43	43
ABC+3TC+RAL	2	2
ABC+TDF+DTG	1	1
ATV/R+DTG	1	1
AZT/3TC+ABC	2	2
AZT/3TC+ATV/r	42	42
AZT/3TC+DTG	3	3
AZT/3TC+EFV	4	4
AZT+3TC(JBE)+DTG	2	2
DRV+RTV+DTG	2	2
EFV/FTC/TDF	4	4
FTC/TDF+ABC	1	1
FTC/TDF+ATV/r	365	365
FTC/TDF+DRV+RTV	3	3
FTC/TDF+DTG	50	50
FTC/TDF+EFV	9	9
FTC/TDF+LPV/r	1	1
FTC/TDF+NVP	1	1
FTC/TDF+RAL	5	5
TDF/3TC/DTG	8884	8884
TDF/3TC/DTG+ATV/r	4	4
TDF/3TC/DTG+DRV+RTV	1	1
TDF/3TC/DTG+DTG	24	24
TDF/3TC/DTG+ERT	1	1
TDF/3TC/EFV	1955	1955
TDF+3TC+ATV/r	1	1
TDF+3TC+DTG	4	4
TDF+3TC+RAL	1	1

TOTAL: 11691

Pregunta 4. Número de adultos y adolescentes (de edad ≥ 10 años) que viven con el VIH en regímenes antirretrovirales de segunda línea a finales de 2023.

N.B. Por favor, empiece por los regímenes con números más altos

Tratamientos antirretrovirales de segunda línea	Número de adultos y adolescentes (de ≥ 10 años) que reciben este régimen de TAR a finales de 2023	TOTAL
3TC+DTG	1	1
ABC/3TC+ATV/r	85	85
ABC/3TC+DRV+RTV	4	4
ABC/3TC+DTG	30	30
ABC/3TC+RAL	6	6
ABC+3TC+ATV/r	4	4
ABC+3TC+DTG	10	10
ABC+3TC+RAL	4	4
ATV/r+DTG	1	1
AZT+3TC+ATV/r	10	10
AZT+3TC+DRV+RTV	2	2
AZT+3TC+RAL	1	1
AZT+3TC+NVP(JBES)	1	1
DRV+RTV+DTG	2	2
FTC/TDF	1	1
FTC/TDF+ATV/r	143	143
FTC/TDF+ATV/r+DTG	1	1
FTC/TDF+DRV+RTV	3	3
FTC/TDF+DTG	4	4
FTC/TDF+RAL	2	2
TDF/3TC/DTG	437	437
TDF/3TC/DTG+DRV+RTV	3	3
TDF/3TC/DTG+DTG	11	11
TDF/3TC/EFV	17	17
TDF+3TC+DTG	1	1

TOTAL: 788

Pregunta 5 Número de adultos y adolescentes (de edad ≥ 10 años) que viven con el VIH, incluidas las mujeres embarazadas que viven con el VIH, con regímenes antirretrovirales de tercera línea/salvamento a finales de 2023.

N.B. Por favor, empiece por los regímenes con números más altos

Regímenes antirretrovirales de tercera línea/salvamento	Número de adultos y adolescentes (de ≥10 años) que viven con el VIH y reciben este régimen de TAR a finales de 2023	TOTAL
TDF/3TC/DTG	81	81
TDF/3TC/DTG+DRV+RTV	34	34
TDF/3TC/DTG+ATV/r	15	15
ABC/3TC+DRV+RTV	5	5
FTC/TDF+DRV+RTV	5	5
TDF/3TC/DTG+ERT	5	5
3TC+DTG	1	1
ABC/3TC+ATV/r	3	3
ABC/3TC+DRV	1	1
ABC/3TC+DRV+RTV+DTG	3	3
ABC/3TC+DRV+RTV+RAL	1	1
ABC/3TC+DTG	3	3
ABC/3TC+DTG+ETR	1	1
ABC+3TC+DRV+RTV	1	1
ABC+3TC+DRV+RTV+ETR	1	1
ATV/r+DTG	3	3
AZT/3TC+ATV/r	1	1
AZT/3TC+DRV+RAL	1	1
DRV+RTV+DTG	3	3
DRV+RTV+RAL	3	3
DRV+RTV+RAL+ETR	2	2
FTC/TDF+ATV/r	3	3
FTC/TDF+ATV/r+ETR	2	2
FTC/TDF+DRV+RTV+RAL	1	1
FTC/TDF+DTG	1	1
FTC/TDF+RAL+ETR	1	1
TDF/3TC/DTG+DRV+RTV+ETR	1	1
TDF/3TC/DTG+DTG	1	1
TDF/3TC/DTG+RTV	1	1
TDF/3TC/DTG+RTV+ETR	1	1
TDF/3TC/EFV+DTG	1	1
TDF+3TC+DRV+RTV+ETR	1	1

2 Tratamiento de niños vih positivos (<10 años)

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: DATOS PROGRAMATICOS PLANILLA DE TRATAMIENTO SAI PLANILLA DE TRATAMIENTO PRONASIDA DATOS DE LABORATORIO

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Pregunta 6. Número de niños (<10 años) que viven con el VIH por línea de tratamiento a finales de 2023

	Número total de niños <10 años VIH positivos que recibían este esquema a fines de 2024
Primera línea	77
Segunda línea	7
Tercera línea/rescate	0
TOTAL	84

Pregunta 7. Número de lactantes y niños (menores de 10 años) que viven con el VIH y reciben tratamiento antirretrovírico de primera línea a finales de 2023

N.B. Por favor, empiece por los regímenes con números más altos

Primera línea	Número de bebés y niños (de <3 años) (A)	Número de bebés y niños de ≥3 a <10 años (B)	Todos los niños de <10 años (A) + (B)
ABC/3TC+DTG	9	18	27
TDF/3TC/DTG	1	16	17
AZT/3TC+LPV/r	0	10	10
AZT/3TC+DTG	2	7	9
AZT/3TC(DISP)+LPV/r(JBE)	0	4	4
AZT+3TC+NVP(JBES)	2	1	3
TDF/3TC/EFV	0	2	2
ABC/3TC(DISP)+DTG(DISP)	1	0	1
AZT/3TC+EFV	0	1	1
AZT/3TC+LPV/r(DISP)	0	1	1
AZT/3TC+LPV/r(JBE)	0	1	1
AZT+3TC+LPV/r(JBES)	1	0	1

TOTAL

	Número de niños < 3 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A)	Número de niños ≥3 a <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (B)	Número de niños <10 años que recibían este esquema a fines del 2015 (A) + (B)
TOTAL	16	71	77

Pregunta 8: Número de niños (menores de 10 años) que viven con el VIH y reciben tratamiento antirretrovírico de segunda línea a finales de 2023

N.B. Por favor, empiece por los regímenes con números más altos

Régimen antirretroviral de segunda línea	Número de niños (de <10 años) que viven con el VIH y reciben este régimen a finales de 2023
TDF/3TC/DTG	2
TDF/3TC/EFV	2
FTC/TDF+DTG	1
LPV/r(JBE)+DTG	1
LPV/r(JBE)+RAL	1

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	7

Pregunta 9 Por favor liste el numero de personas en cada esquema de tratamiento antirretroviral de tercera línea administrado a niños VIH positivos menores de 10 años a fines del 2023.

N.B. Por favor, empiece por los regímenes con números más altos

Regímenes antirretrovirales de tercera línea/salvamento	Número de niños (de <10 años) que viven con el VIH y reciben este régimen a finales de 2023
---	---

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	0

3 Prevención de la transmisión maternoinfantil

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Planilla de seguimiento a la Embarazada y tratamiento ARV Planilla de tratamiento de los Servicios de Atención SAI

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Pregunta 10: Número de mujeres embarazadas que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil y diversas opciones de PTMI durante 2023: 198

Pregunta 11. Número de neonatos por medicamento antirretrovírico utilizado para la profilaxis del VIH en neonatos nacidos de mujeres que viven con el VIH en 2023

Medicamentos antirretrovirales	Número de neonatos que iniciarán este régimen en 2023
AZT (JBE)	80
AZT+NVP (JBE)	3
AZT+3TC+NVP (JBE)	51
AZT/3TC DISPERSABLE	1
AZT/3TC/NVP DISPERSABLE	0
AZT+3TC+RAL (JBE)+DISPERSABLE	1

TOTAL

	Valor de datos
TOTAL	136

4 Servicios de laboratorio

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Datos consolidados por el laboratorio de Referencia del PRONASIDA.

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Prueba del VIH

	Valor de datos
Pregunta 12. Número total de pruebas de diagnóstico rápido del VIH realizadas entre enero y diciembre de 2023	176923
Pregunta 13. Número total de pruebas inmunoenzimáticas (ELISA) del VIH realizadas entre enero y diciembre de 2023	3913
Pregunta 14. Número total de pruebas serológicas de anticuerpos del VIH, incluidas las pruebas de diagnóstico rápido y las pruebas ELISA realizadas entre enero y diciembre de 2023	188894

Pruebas de CD4

	Valor de datos
Pregunta 15. Número total de pruebas de CD4 realizadas entre enero y diciembre de 2023	9052
Pregunta 16. Número total de personas en tratamiento antirretrovírico que se sometieron al menos a una prueba de CD4 entre enero y diciembre de 2023	7037
Pregunta 17. Número total de mujeres embarazadas que viven con el VIH a las que se les realizó al menos una prueba de CD4 entre enero y diciembre de 2023	135

Pruebas de carga viral (CV)

	Valor de datos
Pregunta 18. Número total de pruebas de carga viral realizadas entre enero y diciembre de 2023	12693
Pregunta 19. Número total de personas en tratamiento antirretrovírico que se sometieron al menos a una prueba de carga viral entre enero y diciembre de 2023	9011
Pregunta 20. Número total de mujeres embarazadas que viven con el VIH a las que se les realizó al menos una prueba de VL entre enero y diciembre de 2023	181

Diagnóstico infantil

	Valor de datos
Pregunta 21. Número total de pruebas de diagnóstico infantil realizadas entre enero y diciembre de 2023	684
Pregunta 22. Número total de lactantes (<12 meses) nacidos de mujeres que viven con el VIH a los que se les realizó al menos una prueba de diagnóstico infantil entre enero y diciembre de 2023	374

Pregunta 23. Número total de laboratorios o centros por tipos de pruebas en su país

Tipo de pruebas

	Número de laboratorios o establecimientos de salud donde se recogen muestras	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba	Número de laboratorios o establecimientos de salud en los que se realiza esta prueba y que participan en un programa de evaluación externa de la calidad	Número de laboratorios o establecimientos de salud que requieren actividades de mejora de la calidad en base al ejercicio de evaluación externa de la calidad	Enumere las principales actividades necesarias para mejorar la calidad
Pruebas serológicas de anticuerpos contra el VIH, incluidas pruebas rápidas y ELISA					
Diagnóstico infantil		5			
Pruebas de CD4		12			
Pruebas de carga viral		28			
Pruebas de genotipo de resistencia a fármacos del VIH		1			
GeneXpert (prueba de la tuberculosis)		28			

5 Metas del país con fines de proyección

¿Es el indicador/tema pertinente?: Sí

¿Se dispone de nuevos datos? (No repita datos notificados un año anterior): Sí

Herramienta/fuente de medición:: Especifique

Otra herramienta/fuente de medición:: Calculo de acuerdo a informes programáticos del 2023

Desde la fecha: 01/01/2023

Hasta la fecha: 31/12/2023

Información adicional relacionada con la introducción de datos. Por ejemplo, referencia a la fuente primaria de datos, cuestiones metodológicas::

Datos relacionados con este tema que no se ajustan a las células de indicadores. Especifique la metodología y la referencia a la fuente primaria de datos::

Pregunta 24. Objetivos nacionales para TAR, PTMI y pruebas de laboratorio en los próximos 5 años

Objetivo

	A fines del 2023	A fines del 2024	A fines del 2025	A fines del 2026	A fines del 2027	A fines del 2028
1. Número de adultos y niños en TAR	14780	15519	16295			
1.1 : Número de adultos y adolescentes ≥10 años que reciben TAR	14687	15421	16192			
1.2 : Número de niños <10 años que reciben TAR	93	98	103			
1.2.1 : Número de niños <3 años que reciben TAR	31	33	34			
1.2.2 : Número de niños de 3 a <10 años que reciben TAR	62	65	68			
2. Número de mujeres embarazadas en tratamiento antirretroviral	256	269	282			
3. Número de personas sometidas a la prueba del VIH	687052	721404	757474			
4. Número de personas que se hacen la prueba de CD4	7120	7682	8300			
5. Número de personas que se someten a una prueba de VL	12069	12535	13789			
6. Número de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que se someten a una prueba de diagnóstico infantil	250	262	275			
7. Número de pruebas de serología del VIH	790110	829615	871096			
8. Número de pruebas de CD4	7476	8066	8715			
9. Número de pruebas de LV	13276	13789	15167			
10. Número de pruebas de diagnóstico precoz infantil	482	506	531			

Pregunta 25. Previsiones nacionales a 3 años por régimen de medicamentos antirretrovirales para adultos

Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025	Número de personas con esquema antirretroviral - 2026
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
Total - Primera línea de tratamiento antirretroviral			

Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025	Número de personas con esquema antirretroviral - 2026
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
Total - Segunda línea de tratamiento antirretroviral			

Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025	Número de personas con esquema antirretroviral - 2026
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
Total - Tercera línea de tratamiento antirretroviral			

Pregunta 26. Previsiones nacionales a 3 años por régimen de medicamentos antirretrovirales para niños

Primera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025	Número de personas con esquema antirretroviral - 2026
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
Total - Primera línea de tratamiento antirretroviral			

Segunda línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025	Número de personas con esquema antirretroviral - 2026
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
Total - Segunda línea de tratamiento antirretroviral			

Tercera línea de tratamiento antirretroviral

Esquema	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025	Número de personas con esquema antirretroviral - 2026
---------	---	---	---

Total

	Número de personas con esquema antirretroviral - 2023	Número de personas con esquema antirretroviral - 2024	Número de personas con esquema antirretroviral - 2025
Total - Tercera línea de tratamiento antirretroviral			

Pregunta 27. Previsiones nacionales a 3 años de pruebas del VIH, pruebas de CD4, pruebas de carga vírica y pruebas de diagnóstico precoz infantil

Número de pruebas adquiridas en 2023 y previstas para los próximos tres años

	Pruebas realizadas en 2023	Pruebas previstas para 2024	Pruebas previstas para 2025	Pruebas previstas para 2026
Pruebas de diagnóstico del VIH (pruebas de diagnóstico rápido, autopuebas)	176923	350000		
Pruebas CD4	9052	15000		
Pruebas de carga vírica	12693	15000		
Pruebas de diagnóstico infantil precoz	684	700		

A.2.B Carga viral

287. A partir de las directrices nacionales de tratamiento, indique el umbral en el que la supresión de carga viral¹³ en un individuo se define como suprimida:: ≤ 1000 copias/ml

Si la respuesta es "Otro", especifique:

288. ¿Tiene su país una política nacional actual sobre pruebas de carga viral rutinarias para el monitoreo de la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?

288.a Para adultos y adolescentes: Sí

288.a.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en muchos (del 50 % al 95 %) de los centros de tratamiento

Si la respuesta es "Otro", especifique:

288.b Para niños: Sí

288.b.i. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en muchos (del 50 % al 95 %) de los centros de tratamiento

Si la respuesta es "Otro", especifique:

289. ¿Cuenta actualmente su país con una política nacional sobre las pruebas de carga viral en los puntos de atención?: Sí

289.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el estado de implementación?: Implementado en muchos (del 50 % al 95 %) de los centros de tratamiento

Si la respuesta es "Otro", especifique:

290. En la política nacional, ¿están recomendados los especímenes de manchas de sangre seca para las pruebas de carga viral?: No

Si la respuesta es "Otro", especifique:

290.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el nivel de implementación?:

291. ¿Cuenta el país con una política para dar prioridad a las pruebas de carga viral en determinadas poblaciones (por ejemplo, mujeres embarazadas, recién nacidos y adolescentes)?: Sí

291.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué poblaciones se da prioridad a las pruebas de carga vital (seleccione todas las opciones que correspondan)?: Mujeres embarazadas y lactantes, Pacientes con una situación avanzada de su enfermedad por VIH, Pacientes con sospecha de fracaso del tratamiento, Recién nacidos y niños (entre 0 y <10 años), Adolescentes (entre 10 y 19 años)

Si la respuesta es "Otro", especifique: